

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Departamento Control Nacional
Sección Farmacia

**PROYECTO
FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL
S.O.S. Crema Tópica**

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Departamento de Control Nacional
Registro N° + 12641/02

FORMULA

Cada 100 g de crema contiene:

Benzocaina	1,000 g
Triclosan	0,200 g
Mentol	0,375 g
Alcanfor	0,097 g
Excipientes	c. s.

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.

ACCIONES.

Benzocaina es un anestésico local que actúa bloqueando la iniciación y la conducción de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio.
Triclosan es un potente agente antiséptico que es activo frente a bacterias gram (+) y gram (-), hongos especialmente *Candida albicans*.
Mentol es un alcohol terpénico secundario que aplicado localmente tiene efecto refrescante y produce sensación de frescura, probablemente como resultado de un efecto sobre los nervios sensoriales. También se ha descrito que posee propiedades antisépticas y anestésicas suaves. Produce sensación de frío por estimulación específica de dichos receptores, correspondientes a terminaciones nerviosas libres de los nervios cutáneos o de las mucosas, los mismos que conducen la sensación de dolor.
El Alcanfor aplicado localmente sobre la piel tiene efecto débilmente antiséptico, algo anestésico y rubefaciente.

DESTINO EN EL ORGANISMO.

Los ingredientes activos de esta pomada se fijan sobre la superficie de la piel, desde dónde son absorbidos hacia las capas más internas de ésta, y posteriormente pasan al torrente sanguíneo en muy pequeñas cantidades.

INDICACIONES.

Está indicado para aliviar el dolor y molestias de quemaduras leves (causadas por el sol u otros agentes) o heridas menores de la piel. También se utiliza para el alivio de picaduras de insectos y en caso de prurito.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

No use en zonas cercanas a los ojos, membranas mucosas, labios, boca, genitales, piel irritada y heridas profundas o punzantes.

No usar si sufre de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. Sólo es de uso externo.

No use en caso de quemaduras graves ni por períodos prolongados (más de 7 días). Si la afección persiste, o si se desarrolla infección, erupción cutánea o irritación, suspenda su uso y consulte con un médico.

Si Ud. experimenta rash cutáneo, sensación de quemadura, dolor, hinchazón, etc. después de aplicar este producto discontinúe su uso y consulte a su médico o farmacéutico.

No use en niños menores de 2 años. En niños de entre 2 y 3 años úselo con precaución.

INTERACCIONES.

No se ha informado de interacciones con otros medicamentos.

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.

REACCIONES ADVERSAS.

En algunos casos se ha presentado irritación de la piel, ardor y/o picazón. No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico.

SINTOMAS Y TRATAMIENTO DE LA DOSIS EXCESIVA.

Debida a su aplicación local sobre la piel y a su baja absorción sistémica es muy poco probable la formación de un cuadro de intoxicación.

Se ha informado de efectos asociados al uso discriminado del producto y que son: confusión, visión borrosa, escalofríos, cansancio inusual, dolor intenso, hinchazón en la zona de aplicación, de los ojos y la boca. En este caso Ud. debe consultar al médico en forma inmediata.

VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIFICACION.

Vía de administración: Uso tópico.

Dosificación: Aplique tópicamente 3 a 4 veces al día dando un suave masaje en la zona afectada hasta que la crema desaparezca.

BIBLIOGRAFIA.

- Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica, Goodman y Gilman.
- P.R. Vademecum, 1998.
- Martindale, The Extra Pharmacopoeia 30° Edition.
- P.D.R. 1986. Physicians' Desk Reference 7° Edition.

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.