

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

NOLAIS SHAMPOO 1%

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
Nº Ref:
SECCIÓN REGISTRO

FORMULA

Cada 100 mL de shampoo contiene:

Permetrina 1 g

Excipientes: Acido acético glacial, trietanolamina lauril sulfato (Texapon T-42), emulsión de copolímero de acrilatos (Carbopol Aqua), hidróxido de sodio, acido cítrico anhidro, glicerol, cloruro de sodio, esencia pineapple, agua purificada.

PRESENTACIÓN:

X Frascos de polietileno de alta densidad con X mL de shampoo.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Departamento de Control Nacional

ACCIONES

La Permetrina es una mezcla de los isómeros cis y trans de un piretroide sintético. Es el primer piretroide formulado para uso humano. Actúa sobre la membrana celular nerviosa del *Pediculus capitis* (piojo) para interceptar la corriente de los canales del sodio que regula la polarización de la membrana. Esto da lugar al retraso de la repolarización y parálisis subsiguiente. Es activa contra piojos, ácaros, garrapatas y pulgas.

INDICACIONES.

Tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

12.3 OCT 2004

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con antecedentes de alergia a la Permetrina o a la decametrina. También en caso de presentar heridas o inflamaciones en el cuero cabelludo. No usar en niños menores de 2 años.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Se debe evitar el contacto con los ojos y las membranas de la mucosa durante la aplicación. Si lo anterior ocurre, se debe enjuagar el área con abundante agua. Mantener este producto estrictamente fuera del alcance de los niños. No ingerir. Mantener en un lugar fresco, a no más de 25° C. Si a los 7 días luego del tratamiento inicial se observaran piojos vivos, se debe hacer una segunda aplicación. Si aparecen síntomas de reacción alérgica al medicamento (prurito, eritema, edema) o síntomas de irritación, es necesario suspender el tratamiento y acudir a un médico.

Embarazo y lactancia.

INTERACCIONES.

Aunque no se conocen interacciones específicas relacionadas con el uso de este producto y otros shampoo cosméticos o medicamentos, no es conveniente la aplicación conjunta, podría verse alterada la actividad pediculicida.

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.

REACCIONES ADVERSAS.

En muy raras ocasiones se pueden presentar síntomas de reacción alérgica como picazón, aparición de ronchas, inflamación o irritación. Si lo anterior ocurriera se debe suspender una eventual segundo uso del producto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN.

Vía de administración: Es de uso externo exclusivamente, vía tópica sobre el cabello y cuero cabelludo. Dosificación: Agite bien el frasco antes de usar. Humedecer el cabello y aplicar suficiente cantidad de shampoo sobre el cabello y el cuero cabelludo, friccionando ligeramente, prestando atención a la zona posterior de la cabeza y cercana a la orejas. Durante el friccionamiento los ojos se deben mantener cerrados y bien tapados en los niños, para evitar que entren en contacto con el preparado. Dejar en contacto durante 10 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Secar el cabello y no lavarse la cabeza con shampoo cosmético hasta 24 horas después de la aplicación de este producto para no anular su efecto residual. Un solo tratamiento es suficiente para eliminar la infestación de piojos de la cabeza. Sólo en casos excepcionales ha sido necesario un segundo tratamiento a los 7 días. Se recomienda su aplicación a toda la familia.

BIBLIOGRAFIA.

- Las Bases Farmacológica de la Terapéutica, Goodman y Gilman. - P.R. Vademecum.

FOLLETO PARA LA ORIENTACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.