Folleto de información al Paciente

Aftagel

Gel Tópico bucal

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada 100 g de gel contiene:
Benzocaína 5,0 g
Cetilpiridinio cloruro 0,5 g
Excipientes: Hidroxietilcelulosa, Sorbitol ~~70%~~, Sacarina sódica, Macrogol 400, Etanol, D-pantenol, Eugenol, Agua purificada, c.s.

Frasco con x mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica sobre las mucosas de la boca.

CLASIFICACIÓN

Anestésico y Antiséptico bucal

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES
29 AGO. 2013
N° Ref.: RF466611/13
N° Registro: F-20.252/13
Firma Profesional:

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIÓN

Alivio temporal y sintomático de las molestias producidas por pequeñas heridas en la cavidad bucal.

USOS

~~Alivia en forma rápida el dolor y ardor producidos por pequeñas heridas en la cavidad bucal. Bucal.~~ Previene la infección desinfectando el área erosionada. Proporciona alivio a las molestias producidas por prótesis dentales. Coadyuvante en el tratamiento de micosis bucal y afecciones herpéticas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este fármaco provee alivio temporal a los síntomas descritos, pero en ningún caso resuelve el origen de ellos.
- No aplique sobre las encías después de la extracción de alguna pieza dentaria
- Si la irritación o molestias persisten por varios días o si se desarrolla fiebre, discontinúe su uso y consulte a su dentista o médico.
- Este producto no debe ser utilizado por más de 7 días seguidos.
- No tome este medicamento sin antes consultar al Farmacéutico si Ud. presenta alguna alergia ya sea a otro medicamento, colorante, edulcorante o saborizante.

CONTRAINDICACIONES

Este medicamento no debe ser usado en personas sensibles a la Benzocaína o algún otro componente de la fórmula.

INTERACCIONES

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración en junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando con o sin receta médica antes de usar este medicamento.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad dando lugar a efectos no deseados algunos de ellos severos.

Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico si Ud. padece alguna enfermedad.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.

Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un período muy prolongado y/o en grandes dosis.

Si aparece cualquiera de los siguientes efectos deje de aplicar el medicamento y consulte al médico: ~~ejemplo:~~ rash cutáneo, urticaria o inflamación por reacción alérgica**; Piel, labios y base de las uñas pálidas, grises o con coloración azulada, dificultad para despirar, fatiga, confusión, dolor de cabeza, mareos, taquicardia.**

Hay otros efectos que se pueden manifestar, pero que no necesitan normalmente atención médica y que desaparecen con el tiempo, ejemplo: puede producir adormecimiento prolongado de labios y boca.

Si usted nota otros efectos no mencionados que considere extraños, importantes o molestos, consulte con su médico.

MODO DE USO

Aplique con un algodón o aplicador directamente en la herida o inflamación bucal, 4 veces al día. Trate de que permanezca el mayor tiempo posible para formar la capa protectora.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga en su envase original, protegido del calor (a no más de 25°C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicado en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
No recomiende este medicamento a otra persona

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE