

AMBROXOL HCl

Jarabe 15 mg/5mL

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada 5 mL de jarabe contiene:	
Ambroxol Clorhidrato	15 mg
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Mucolítico expectorante.

Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en toses secas.

CONTRAINDICACIONES.

No debe administrarse a pacientes con hipersensibilidad conocida al ambroxol, bromhexina y/o a cualquiera de los componentes del preparado. No debe tomar este medicamento si se encuentra embarazada o en periodo de lactancia o si presenta ulcera péptica. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en toses secas.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

- **Embarazo:** este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.
- **Lactancia:** este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su medico la conveniencia de seguir el tratamiento dejar de amamantar.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Por lo general ambroxol es bien tolerado. Se han comunicado ligeros trastornos del tracto gastrointestinal superior (principalmente pirosis y dispepsia y ocasionalmente, nauseas y vómitos). Raras veces se han producido reacciones alérgicas, sobre todo exantemas

cutáneos. En muy Raros casos se han comunicado reacciones agudas graves de tipo anafiláctico, pero su relación con el ambroxol es dudosa. Algunos de estos pacientes presentaban historial de hipersensibilidad a otras sustancias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Úsese con precaución en pacientes con historial de úlcera péptica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

- **Medicamentos:** usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente anticoagulantes como la warfarina.
- **Enfermedades:** usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica o severa. En el caso particular de este medicamento, si ha presentado convulsiones, enfermedades neurológicas, úlcera gastroduodenal.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso en particular, no obstante la dosis usual es:

Rango y Frecuencia: Dosis adultos y niños mayores de 12 años: 60 a 90 mg al día; 30 mg (2 cucharaditas o 10 mL) cada 8 horas. Niños mayores de 6 años: 15 mg (1 cucharadita o 5 mL) 3 veces al día. Niños de 2 a 6 años: 7,5 mg (Media cucharadita o 2,5 mL) 3 veces al día. Niños menores de 2 años: 7,5 mg (Media cucharadita o 2,5 mL) 2 veces al día.

Consejo de cómo administrarlo: Debe tomarlo con abundante líquido en el caso de los comprimidos, cuando se trata de jarabes se debe administrar con la cuchara de dosificación que adjunte el envase, de lo contrario lo más recomendable es que utilice una jeringa sin aguja (limpia, sin uso previo) para administrar la dosis exacta, luego se puede tomar algún líquido.

Uso Prolongado: Si persiste o se intensifica la tos después de 7 días de tratamiento consulte con su médico, ya que se puede estar ocultando una enfermedad severa.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ambroxol es prácticamente atóxico. Como cualquier medicación se recomienda en un caso eventual de sobredosis suprimir la droga.

ALMACENAMIENTO.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C.

PRESENTACIÓN.

Frasco con 100 mL de Ambroxol Jarabe 15 mg/5 mL.