

AMBROXOL HCl

Jarabe 30 mg/5mL

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada 5 mL de jarabe contiene:	
Ambroxol Clorhidrato	30 mg
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Mucolítico expectorante.

Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo asma, enfisema o en toses secas.

CONTRAINDICACIONES.

No debe administrarse a pacientes con hipersensibilidad conocida al Ambroxol, bromhexina y/o a cualquiera de los componentes del preparado. No debe tomar este medicamento si se encuentra embarazada o en periodo de lactancia o si presenta ulcera péptica. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en toses secas.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

- **Embarazo:** este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.
- **Lactancia:** este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su medico la conveniencia de seguir el tratamiento dejar de amamantar.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Por lo general Ambroxol es bien tolerado. Se han comunicado ligeros trastornos del tracto gastrointestinal superior (principalmente pirosis y dispepsia y ocasionalmente, nauseas y vómitos). Raras veces se han producido reacciones alérgicas, sobre todo exantemas cutáneos. En muy Raros casos se han comunicado reacciones agudas graves de tipo

anafiláctico, pero su relación con el Ambroxol es dudosa. Algunos de estos pacientes presentaban historial de hipersensibilidad a otras sustancias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Úsese con precaución en pacientes con historial de úlcera péptica.

INTERACCIONES

La administración de Ambroxol junto con antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, eritromicina, doxicilina) eleva la concentración del antibiótico en el tejido pulmonar.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de Administración: Oral

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso en particular, no obstante, la dosis usual es:

Rango y Frecuencia: Dosis adultos y niños mayores de 12 años: 60 a 90 mg al día; 30 mg (2 cucharaditas o 10 mL) cada 8 horas.

Consejo de cómo administrarlo: Cuando se trata de jarabes se debe administrar con la cuchara de dosificación que adjunte el envase, de lo contrario lo más recomendable es que utilice una jeringa sin aguja (limpia, sin uso previo) para administrar la dosis exacta, luego se puede tomar algún líquido.

SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO.

Ambroxol es prácticamente atóxico. Como cualquier medicación se recomienda en un caso eventual de sobredosis suprimir la droga.

ALMACENAMIENTO.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, en lugar fresco y seco, a no más de 25°C.

PRESENTACIÓN.

Frasco con 100 mL de Ambroxol Jarabe 30 mg/5 mL.