

CLOBETASOL 0,05%

CREMA TÓPICA

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada 100 g de crema contiene:	
Clobetasol Propionato	0,050 g
Excipientes: Los aprobados en registro	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Corticoide

Está indicado en el tratamiento a corto plazo de manifestaciones inflamatorias de dermatosis que no responden a corticoides menos activos.

Usos del Clobetasol: psoriasis, se excluyen las formas eritrodérmica, diseminada e invertida. Eczemas recalcitrantes. Liquen plano. Lupus eritematoso discoide.

CONTRAINDICACIONES.

Está contraindicado para niños menores de 12 años y en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación. Clobetasol está contraindicado en rosácea, acné y dermatitis perioral; lesiones cutáneas consecuentes a infecciones por virus (por ej.: herpes simple, varicela), hongos (por ej.: candidiasis, tiña) o bacterias (por ej.: impétigo), parásitos, lesiones ulceradas, dermatitis perianal, prurito perianal o genital y atrofiaciones de la piel preexistentes.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

En el embarazo ha de evitarse su empleo en zonas extensas, a altas concentraciones o en terapias prolongadas.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados).

En forma ocasional se pueden presentar reacciones locales como sensación de calor, prurito, irritación, sequedad, foliculitis, hipertrichosis, erupciones acneiformes o pustulosas, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica por contacto, maceración de la piel, infección secundaria, atrofia de la piel y fisuras cutáneas, cataratas, síndrome de Cushing, edema, úlcera gástrica, glaucoma secundario, hirsutismo, síndrome hipocalémico, pigmentación de la piel, inusual pérdida de cabello, hipertrichosis, desecación, púrpura equimótica secundaria a la atrofia y crear o agravar una rosácea.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Antes de usar este medicamento deben evaluarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes: Está contraindicado en alergia a los corticoides, infecciones de origen vírico, como la varicela, herpes simple y herpes zoster, procesos tuberculosos o luéticos en la zona de tratamiento. No se debe aplicar en tratamiento ocular, zonas próximas a los ojos, ni en vendaje oclusivo en zonas muy extensas de la piel, pues podría producirse absorción sistémica con riesgo de toxicidad.

No es recomendable el uso en niños menores de 12 años, siendo preferible la utilización de sustancias menos potentes, ante el riesgo de supresión adrenal y retraso en el crecimiento tras su absorción sistémica.

INTERACCIONES

No se conocen hasta la fecha.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral.

La dosis y período de tratamiento debe ser indicado por el médico en su caso particular, pero en general la dosis recomendada es: Aplicar una pequeña cantidad sobre la región afectada dos veces al día hasta que ocurra mejoría. Al igual que los demás corticosteroides dérmicos de alta potencia, cuando la lesión sea controlada la terapia debe ser interrumpida. Se recomienda que el tratamiento no exceda a 2 semanas. Si fuera necesario un tratamiento más prolongado, se debe usar un corticosteroide menos potente y reservar el Clobetasol propionato para el control de las exacerbaciones agudas.

SOBREDOSIFICACIÓN.

El tratamiento prolongado puede dar origen, particularmente en lactantes y niños, a la supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Por esta razón, los pacientes deben ser reevaluados periódicamente.

ALMACENAMIENTO.

Mantenga en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN.

Pomo con 25 g de Clobetasol Crema.