

Clotrimin Polvo 31/7/90

FUNZAL POLVO 1% clotrimazol

FOLLETO DE INFORMACION MEDICA

LENTO PARA INFORMACION
MEDICA EXCLUSIVAMENTE. NO
INCLUIDO EN EL PROCESO DE
VENTA AL PUBLICO

FUNZAL POLVO es un antimicótico de amplio espectro. Su principio activo, el Clotrimazol ejerce su acción antimicótica alterando la permeabilidad celular, aparentemente uniéndose con los fosfolípidos de la membrana celular del hongo. Como consecuencia, la membrana celular es incapaz de funcionar como una barrera selectiva, perdiéndose potasio y otros constituyentes celulares.

El Clotrimazol inhibe o mata una gran variedad de hongos, incluyendo levaduras y dermatofitos.

La absorción de Clotrimazol aplicado por vía tópica es mínima.

El Clotrimazol se reparte en las diferentes capas de la piel en su forma no metabolizada, con concentraciones decrecientes desde la epidermis hasta la dermis profunda. Se observan concentraciones máximas en la capa queratinizada y a lo largo de los folículos pilosos.

INDICACIONES

Dermatomicosis cualquiera sea su localización, extensión, antigüedad, agente micótico causal, ~~estén o no sobreinfectadas por bacterias gram positivas.~~

Candidiasis

- En pliegues: intertrigos génito-crurales, anales o perianales.
- Interdigitales
- De la comisura bucal
- Onixis y perionixis
- Sobreinfección por *Candida* en dermatosis

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Departamento de Ciencia Farmacéutica
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

3/17/90

Dermatofitos

- Tratamiento de tiña circinada
- Tratamiento único o tratamiento complementario en:
 - . Intertrigos genitales o crurales (exzema marginado)
 - . Pie de atleta
 - . Micosis dérmica y Tiña querión

ENCUENTRO PARA INFORMACION
MEDICA EXCLUSIVAMENTE PARA
USO EN LA CLINICA EN
VENTA AL PUBLICO

Otros

- Pitiriasis versicolor
- Eritrasma

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a clotrimazol u otro componente del preparado.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente puede originar irritación o sensación de quemadura inmediatamente después de la aplicación, lo que generalmente desaparece durante la consecución del tratamiento.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Aplicar tres veces al día espolvoreando sobre las áreas afectadas, durante aproximadamente 3 semanas.

En caso de aplicación en los pies, previamente lavar bien y secar rigurosamente.

En tratamiento de pie de atleta se recomienda aplicar en los calcetines y calzado.

- Afecciones de los pies: Prolongar el tratamiento por 2 semanas a partir de la remisión de los síntomas para evitar recaídas.

PRESENTACION

Frascos con 30 gramos.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Departamento de Control de Medicamentos
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas