

MEDIPHARM S.A.
SAN EUGENIO 820 SANTIAGO - CHILE
FONO: 237 82 90
FAX: 237 82 96 - Email: info@medipharm.cl

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

CLOTRIMIN Solución tópica 1%

CLOTRIMIN SOLUCIÓN TÓPICA 1%

Condición de venta: con receta médica ~~de uso tópico~~

Clasificación: antifúngico

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y presentación:

Cada 100 mL de loción contiene

Clotrimazol 1 g

Excipientes: Magrogol 400, Propilenglicol, Alcohol isopropílico.

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de **tópico candidiasis cutánea** ~~la tinea pedis, tinea cruris, y tinea corporis y tinea versicolor causada por Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Candidiasis causada por Candida Albicans y tinea versicolor causada por Malassezia Furfur complicada con inflamación y prurito.~~

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDEPTO. REGISTRO UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES
04 MAR 2008
Nº Ref: 12022.107
Nº Registr: F-16.733/08
Firma Profesional: 

MEDIPHARM S.A.

SAN EUGENIO 820 SANTIAGO - CHILE

FONO: 237 82 90

FAX: 237 82 96 - Email: info@medipharm.cl

2.- Administración (tópica)**- Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: aplicar la loción al 1% dos veces al día en la zona afectada. La duración del tratamiento es variable y no debe usarlo por más o menos tiempo que el señalado por el médico.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección. **Para evitar una recaída, se recomienda proseguir el tratamiento al menos dos semanas de desaparecidos todo signo de infección.**

- Consejo de cómo administrarlo

Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos del último tratamiento. No debe utilizar vendajes que no permitan transpirar a la zona de infección.

3.- Precauciones**- Mayores de 60 años**

No existen recomendaciones especiales para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al feto, **consulte con el médico antes de usarlo, debido a que no ha sido demostrada su inocuidad.**

- Lactancia

Este medicamento puede ser absorbido (aunque en pequeñas cantidades) por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta con su pediatra. No existen precauciones especiales en el caso del clotrimazol tópico.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

MEDIPHARM S.A.

SAN EUGENIO 820 SANTIAGO – CHILE
FONO: 237 82 90
FAX: 237 82 96 – Email: info@medipharm.cl

- Precauciones especiales

Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecido antes.

Debe evitar el contacto de la loción con los ojos. **No debe aplicarse este medicamento sobre la piel eczematosa, ojos, nariz, labios, zonas heridas, genitales, zona anal u otras mucosas.**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

CONTRAINDICACIONES**4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia al clotrimazol u otro antifúngico azólico.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones**- Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente al médico.

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

MEDIPHARM S.A.

SAN EUGENIO 820 SANTIAGO - CHILE
FONO: 237 82 90
FAX: 237 82 96 - Email: info@medipharm.cl

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha **usado** ~~tomado~~.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, **bien cerrado, alejado del fuego y calor**, protegido del calor, luz y humedad a **menos de 25°C** ~~la temperatura señalada en el envase~~
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE