


FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

CORTIGRIP DÍA-NOCHE Comprimidos

CORTIGRIP DÍA-NOCHE Comprimidos

Condición de venta: con receta médica

Clasificación: antigripal



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y presentación :

Comprimido DIA:

Paracetamol 500 mg.

Pseudofedrina Clorhidrato 30 mg.

Excipientes c.s.

Excipientes: Almidón de maíz, almidón glicolato de sodio, povidona, macrogol 6000, talco, ácido esteárico, sorbitol, dióxido de silicio.

Comprimido NOCHE:

Paracetamol 500 mg.

Pseudofedrina Clorhidrato 30 mg.

Clorfenamina Maleato 4 mg.

Excipientes c.s.

Excipientes: Almidón de maíz, almidón glicolato de sodio, povidona, macrogol 6000, talco, ácido esteárico, sorbitol, dióxido de silicio, colorante azul N°1.

Disponible en envases conteniendo 10 Comprimidos DIA (Blancos), y 5 Comprimidos NOCHE (Celestes).

1.- ¿Para qué se usa?

Alivio sintomático en resfrío común y estados gripales ~~con o sin fiebre.~~
~~Congestión en las vías respiratorias~~ o malestar general provocado por congestión alérgica.

Indicaciones:

~~Alivio sintomático en resfrío común y estados gripales con o sin fiebre.~~
~~Congestión de vías respiratorias.~~

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia **dosis usual**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 1 comprimido **día** (500 mg. de paracetamol, 30 mg. de pseudoefedrina clorhidrato ~~y 4 mg. de eforfenamina maleato~~) ~~cada 8 horas~~ dos veces al día (cada 6-8 horas) y 1 comprimido **noche** 30 minutos antes de acostarse (con una diferencia de 6-8 horas de la toma de la última dosis del comprimido día).

Posología:

~~No administrar más de 4 gramos diarios.~~

Advertencia:

No administrar por más de 5 días en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre, o por más de dos días en caso de dolor de garganta sin consultar al médico.

No administrar más de 4 g de paracetamol al día. El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol, puede provocar severo daño hepático.

- Consejo de cómo administrarlo

Se aconseja tomarlo junto con las comidas y con un vaso de agua.

-Uso prolongado

No debe utilizarlo por más de 7 días, ya que si pasado este periodo de tiempo los síntomas no han desaparecido debe consultar con su médico, nuevamente.

3.- Precauciones

-Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

-Consumo de alcohol

Debe evitar consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este puede provocar un aumento de los efectos adversos del medicamento.

-Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, somnolencia y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

-Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe conversar con el médico, la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

-Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de tomar este medicamento.

-Lactantes y niños

~~El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.~~

No administrar a niños menores de 12 años.

-Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico, nuevamente.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clorfenamina, paracetamol y/o pseudoefedrina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

-Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente antidiabéticos, otros analgésicos, antihistamínicos, antitusivos, y en general si se encuentra en tratamiento con cualquier otro medicamento, ya que el consumo de este antigripal puede alterar el efecto de otros medicamentos y causarle daño a su salud.

-Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de antecedentes de abuso de alcohol, anemia, gota, enfermedades cerebrales, colitis, convulsiones, diarrea, fibrosis quística, diabetes mellitus, enfisema pulmonar, asma, o alguna enfermedad pulmonar crónica, hipertrofia prostática, dificultad para orinar, glaucoma, hipertensión, alguna enfermedad a la tiroides.

-Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: diarrea, pérdida del apetito, náusea o vómitos, calambres o dolor estomacal, rash, picazón o escalofríos, dolor de garganta y fiebre que no se habían presentado antes, mareos, ojos y piel de color amarillo, convulsiones, sequedad de boca, nariz o garganta, enrojecimiento de la cara, alucinaciones, dificultad par respirar, cambios en el ritmo de los latidos del corazón.

-Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación, dificultad o dolor para orinar, mareos leves, sequedad de boca, nariz o garganta, aumento de la sensibilidad de la piel al sol, náuseas o vómitos, dolor estomacal, nerviosismo, palidez, irritabilidad.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: calambres o dolor estomacal, diarrea, convulsiones, etc.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**