



**MEDIPHARM S.A.**

SAN EUGENIO 820 SANTIAGO - CHILE  
FONO: 237 82 90  
FAX: 237 82 96 - Email: info@medipharm.cl

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  
Departamento Control Nacional  
Sección Registro

**FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE**

**CORTIGRIP**  
Comprimidos

12 0 SEP 2005

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

**1 COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:**

Cada comprimido contiene:

Paracetamol	500 mg
Pseudoefedrina clorhidrato	30 mg
Excipientes	c.s.

Excipientes: Almidón de maíz, almidón glicolato de sodio, polividona, macrogol 6000, talco, ácido esteárico, sorbitol, dióxido de silicio.  
Envase con X comprimidos

**2 INDICACIÓN:**

**“Tratamiento sintomático del resfrío común, estados gripales y congestión nasal asociado con sinusitis”.**

~~Alivio sintomático en resfrío común y estados gripales con o sin fiebre. Congestión de las vías respiratorias altas.~~

**3 CLASIFICACIÓN:**

Descongestionante, analgésico.

**4 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

Úsese solo por indicación y bajo supervisión médica.

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  
Departamento Control Nacional

REGISTRO N° F-15151/05

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL

N° Ref.: 17336/05

SECCIÓN REGISTRO



## MEDIPHARM S.A.

SAN EUGENIO 820 SANTIAGO - CHILE  
FONO: 237 82 90  
FAX: 237 82 96 - Email: info@medipharm.cl

- a) **Alergias:** Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimento, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.
- b) **Embarazo:** No debe tomar este medicamento sin antes comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. Este medicamento no se debe usar durante el embarazo o por mujeres que estén en condiciones de embarazarse. En el último caso debe usarse un método de control de la natalidad adecuada, durante el tratamiento con este medicamento. Si usted cree estar embarazada, consulte inmediatamente con su médico. Este medicamento puede causar defectos en el feto u otros problemas si se toma durante el embarazo.
- c) **Lactancia:** Usted debe conversar con el médico acerca de la conveniencia de uso de este producto mientras esté amamantando. No se recomienda su uso durante la lactancia ya que puede causar efectos indeseables en el lactante.
- d) Este medicamento puede causar excitación, particularmente en niños. Se debe tener precaución al conducir un vehículo o al operar maquinaria debido a la somnolencia que causa el producto.
- e) No es recomendable su uso por más de 5 siete días. Puede causar daño hepático y renal. Puede causar dependencia. El paracetamol en adultos no se debe exceder la dosis límite de 4 gramos por día (**8 comprimidos**). No debe usarse por más de tres días para el tratamiento de fiebre, sin consultar al médico. Se debe advertir a los pacientes no tomar antihistamínicos o simpaticomiméticos adicionales cuando se encuentren bajo tratamiento con CORTIGRIP.
- f) No debe consumirse alcohol cuando se utilice este medicamento.

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE

### 5 CONTRAINDICACIONES:

Si Ud. sufre alguna enfermedad, debe consultar al médico antes de ingerir este medicamento. No usar en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- No se administre a niños menores de 12 años.
- ~~— No se administre a pacientes que estén tomando o hayan tomado en las dos últimas semanas inhibidores de monoaminoxidasa.~~
- ~~— No debe administrarse a pacientes con cardiopatía, hipertensión arterial, glaucoma o hipertrofia prostática o daño renal.~~



**MEDIPHARM S.A.**

SAN EUGENIO 820 SANTIAGO - CHILE  
FONO: 237 82 90  
FAX: 237 82 96 - Email: info@medipharm.cl

~~No administrar simultáneamente con medicamentos depresores del sistema nervioso central ni con bebidas alcohólicas.~~

## 6 INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

**Interacciona con: antidepressivos, alcohol, ansiolíticos, antihipertensivos, levodopa, medicamentos tipo IMAO, hormonas tiroideas.**

## 7 EFECTOS ADVERSOS (no deseados):

No se alarme por esta lista de posibles reacciones adversas, ya que aquellas de carácter más grave sólo se producen en raras ocasiones.

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos adversos que normalmente no requieren atención médica, a menos que sean demasiado molestos o no desaparezcan durante el curso del tratamiento: Cuando se excede la dosis puede presentarse nerviosismo, vértigo o insomnio, pero puede causar excitabilidad especialmente en los niños. Se han descrito reacciones de carácter alérgico, como rash cutáneo, prurito y ataques de asma, sequedad de la boca, insomnio, jaqueca, ansiedad, cansancio o debilidad corporal.

FULLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE

## 8 FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Este medicamento se debe administrar por vía oral con un vaso de agua.

### **Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es la siguiente:

Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años, 1 comprimido dos veces al día.

## 9 SOBREDOSIS:

Cualquier medicamento tomado en exceso puede acarrear serias consecuencias. Si Ud. sospecha una sobredosis, solicite atención médica inmediatamente.

En caso de sobredosis, debe iniciarse inmediatamente el tratamiento sintomático y coadyuvante, manteniéndolo durante todo el tiempo necesario.

Manifestaciones:

Pseudoefedrina clorhidrato: A dosis elevadas, los medicamentos simpaticomiméticos pueden producir mareos, cefalalgia, vómitos, sudoración, sed, taquicardia, dolor precordial, palpitaciones, hipertensión, dificultad para la micción, debilidad muscular,



**MEDIPHARM S.A.**

SAN EUGENIO 820 SANTIAGO - CHILE  
FONO: 237 82 90  
FAX: 237 82 96 - Email: info@medipharm.cl

tensión, ansiedad, inquietud e insomnio. Algunos pacientes pueden presentar psicosis tóxicas con ilusiones y alucinaciones. Algunos pueden desarrollar arritmias cardíacas, colapso circulatorio, convulsiones, coma e insuficiencia respiratoria.

Paracetamol: Los síntomas incluyen palidez, náusea, dolor abdominal, vómitos, hemorragia gastrointestinal, daño hepático, edema cerebral, necrosis tubular renal.

~~Tratamiento: Debe inducirse el vómito si ha ocurrido emesis espontáneamente. Sin embargo, no se debe inducir el vómito en pacientes con menoscabo de la conciencia. Después del tratamiento de urgencia el paciente debe continuar bajo vigilancia médica.~~

#### 10 **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y humedad, a no más de 25° C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE