

**PROYECTO
FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
S.O.S. Crema Tópica**

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Departamento de Control Nacional
Registro N° F-12641/02

Vía de administración: Uso tópico

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición:

Cada 100 g de crema contiene:

Benzocaína	1,000 g
Triclosan	0,200 g
Mentol	0,375 g
Alcanfor	0,097 g
Excipientes	c. s.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

Clasificación:

Analgésico y antiséptico de uso tópico.

Recomendaciones de uso:

Alivia el dolor y las molestias producidas por quemaduras leves (causadas por el sol u otros agentes) o heridas menores de la piel. También alivia las molestias producidas por picaduras de insectos y por prurito (picazón).

Precauciones:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso. Principalmente se debe considerar los siguientes aspectos:

- Alergia:** Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, antisépticos u otros medicamentos, particularmente a los anestésicos o desinfectantes de uso local.
- Embarazo:** No existe información suficiente como para garantizar la seguridad del uso de estos productos en estos casos, aunque tampoco se han reportado problemas específicos. No se recomienda su uso excepto por prescripción médica.

- c) Lactancia: Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando.
- d) Niños: No usar en niños menores de 2 años. En niños de entre 2 a 3 años usar con precaución.

Advertencias:

- No use en zonas cercanas a los ojos, membranas mucosas, labios, boca, genitales, piel irritada o heridas.
- No use si sufre de hipersensibilidad (alergia) a alguno de los componentes de la formulación.
- Sólo para uso externo, no ingerir. La ingesta de este producto puede causar serios efectos secundarios, especialmente en niños.
- No aplicar por tiempo prolongado, consulte a su médico si la condición persiste por más de 7 días.
- Si Ud. experimenta rash cutáneo (picazón, ronchas) sensación de quemadura, dolor, hinchazón, etc. después de aplicar este producto discontinúe su uso y consulte a su médico o farmacéutico.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe evitar usar otros productos en la piel si está usando éste.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, alguno de ellos severos.

Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico si padece de alguna enfermedad, antes de usar este medicamento, particularmente dermatológicos (de la piel) como infecciones, piel resquebrajada, partida, etc.

Efectos adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Si Ud. presenta: picazón, roncha generalizadas, consulte al médico de inmediato y deje de usar el producto.

También pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso, ellos son: irritación de la piel y picazón.

No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico. Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico o farmacéutico

Modo de uso:

Aplique tópicamente 3 a 4 veces al día dando suave masaje en el área afectada hasta que la crema desaparezca. No se debe aplicar en forma masiva ni prolongada.

Debido a la presencia de alcanfor no use en menores de 2 años y en niños de entre 2 y 3 años con precaución.

Condiciones de almacenamiento.

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga en su envase original, protegido del calor (a menos de 25° C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicado en el envase.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE