



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
DIVISIÓN PHARMA

**KETOCONAZOL SHAMPOO 2%**

Fecha de edición: 3-2007  
Página : 1 / 2

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o al Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

### Composición y presentación.

Cada 100 ml de shampoo contiene:

Ketoconazol 2 g

Excipientes: Lauril éter sulfato de sodio, dietanolamina de ácido graso de coco, cocoamidopropilbetaína, coco glucósido, gliceril oleato, dicaprilil éter, lauril alcohol, propilenglicol, polietilenglicol- 120 metilglucosa dioleato, diazolidinil urea, iodopropinil butilcarbamato, perfume, colorante rojo FD&C N° 40, agua purificada.

Frasco con 100 X ml de shampoo.

### Clasificación.

Antimicótico de acción local.

### Indicaciones.

~~Ketoconazol shampoo está indicado en el tratamiento de la pitiriasis del cuello cabelludo, dermatitis seborreica, pitiriasis versicolor, pitiriasis capitis (caspa).~~

**"Tratamiento tópico de la dermatitis seborreica y pitiriasis versicolor del cuero cabelludo, manifestada principalmente por la caspa del cabello".**

### Contraindicaciones.

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad al Ketoconazol y otros antifúngicos imidazolónicos.

### Advertencias y precauciones.

- Si se presenta irritación o dermatitis alérgica, el tratamiento debe suspenderse.
- No usar en pacientes que presentan reacciones alérgicas a otros antifúngicos.
- No usar durante el embarazo.
- No aplicar cerca de los ojos o membranas mucosas.
- El uso de este medicamento requiere diagnóstico y supervisión médica.
- El uso y dosis en niños debe ser determinado por el médico.



FOLLETO DE INFORMACION  
AL PACIENTE



**KETOCONAZOL SHAMPOO 2%**

Fecha de edición: 3-2007  
Página : 2/ 2

El médico debe evaluar su uso durante la lactancia, ya que no se tienen suficientes estudios que permitan descartar la absorción y paso a través de la leche, en uso habitual; aún cuando una dosis única no sea absorbida a través de la piel.  
Puede presentarse raramente sensación local de ardor, prurito y cabello graso/seco.  
En raros casos, principalmente en pacientes con cabello dañado químicamente o cabello gris, se ha observado decoloración del cabello.

#### **Efectos adversos (no deseados).**

Se puede presentar irritación cuando se usa Ketoconazol shampoo inmediatamente después de tratamientos prolongados con corticoides tópicos.

#### **Sobredosis.**

En caso de ingestión accidental, no debe emplearse la emesis o el lavado gástrico para evitar aspiración, sólo deben emplearse medidas de rutina, acudiendo a un centro asistencial.

#### **Vía de administración y dosis usual.**

Uso tópico. El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es 2 o 3 veces por semana durante 4 semanas.

#### **Condiciones de almacenamiento.**

Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor (a menos de 25° C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
No recomiende este medicamento a otra persona. No repita el tratamiento sin consultar al médico.

~~Elaborado y envasado para MED-CELL S.A., Caupolicán 9261 A-B, Quilicura, Santiago-Chile, por Farminindustria S.A., Camino a Melipilla 7073, Santiago.  
Distribuido por MED-CELL S.A.~~

FOLLETO DE INFORMACION  
AL PACIENTE