

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****GESIDOL COMPRIMIDOS 1 g****FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****GESIDOL COMPRIMIDOS 1g  
(PARACETAMOL)**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

**COMPOSICIÓN**

Cada comprimido contiene:

Paracetamol	1000 mg
Excipientes	csp.

Excipientes: Almidón de maíz pregelatinizado, almidón de maíz, povidona K-30, ácido esteárico, talco.

**VIA DE ADMINISTRACIÓN**

Vía Oral

**~~CLASIFICACION TERAPEUTICA~~ GRUPO TERAPÉUTICO:**

Analgésico, antipirético. Otros analgésicos y antipiréticos. Anilidas

**RECOMENDACIONES DE USO**

Fiebre, dolor de cabeza, dolor de muelas o dientes, dolor muscular y para el alivio del malestar de la gripe y resfrío.

**INDICACIONES**

Tratamiento sintomático de dolores leves a moderados y estados febriles

**CONTRAINDICACIONES**

Este medicamento no debe ser usado en pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones, a menos que el médico lo indique expresamente:

Hipersensibilidad: Si ha presentado trastornos o reacciones alérgicas al paracetamol (o acetaminofeno), aspirina (ácido acetilsalicílico) o a alguno de los otros componentes de la formulación.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****GESIDOL COMPRIMIDOS 1 g**

No debe ser usado en pacientes con enfermedad hepática o renal grave.  
No debe ser usado en pacientes que han ingerido alcohol en exceso.  
No debe ser usado en pacientes con enfermedad hepática o renal grave.  
No debe ser usado en pacientes con anemia pre-existente o mal funcionamiento cardíaco.

**ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido de 1 g cada 8 horas, sin exceder los 4 comprimidos al día (4 g).

Según sea necesario, se debe administrar por un máximo de 5 días, si se usa para aliviar un dolor o, 3 días si se usa para controlar la fiebre. Si no hay mejoría o aparecen otros síntomas, consulte con su médico.

**ADVERTENCIAS**

No administrar por más de 5 días seguidos en caso de dolor sin fiebre, por más de 3 días en caso de fiebre o por más de 2 días en caso de dolor de garganta, sin consultar antes con el médico.

El paciente deberá suspender el medicamento y consultar con el médico en las siguientes condiciones:

Si los síntomas no mejoran,

Si aparecen otros síntomas.

Si el dolor o la fiebre no mejoran o empeoran

Si junto con el dolor de garganta presenta dolor de cabeza, manchas en la piel, náuseas o vómitos.

El uso prolongado y/o la administración de altas dosis de paracetamol, puede provocar daño hepático severo.

Este producto no debe administrarse a menores de 12 años sin consultar la dosis al médico.

Paracetamol es un medicamento que se encuentra sólo o en combinación con otros principios activos en productos destinados al tratamiento de resfrío, tos, alergia, entre otros. Algunos de estos productos pueden venderse libremente y otros requieren receta médica.

Paracetamol puede causar, aunque con poca frecuencia, reacciones graves a la piel, que pueden manifestarse con enrojecimiento, erupción cutánea,

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****GESIDOL COMPRIMIDOS 1 g**

ampollas, y daños en la superficie de la piel. Si usted desarrolla erupción cutánea u otra reacción a la piel mientras el paracetamol, deje de tomarlo y acuda al médico inmediatamente.

Si ya ha tenido reacciones a la piel con Paracetamol, no tome medicamentos que lo contengan.

Paracetamol puede causar, en dosis superiores a las habituales, graves daños al hígado, que se pueden manifestar con síntomas como fatiga inusual, anorexia, náuseas y/o vómitos, dolor abdominal, ictericia (coloración amarilla de piel y/o de la zona blanca de los ojos), orina oscura, o deposiciones blanquecinas. En caso de presentar alguno de estos síntomas, suspensa el uso del medicamento y acuda al médico.

Es importante mantener este medicamento lejos del alcance de los niños y de personas con tendencias suicidas, y acudir por ayuda médica inmediatamente si se ha ingerido una cantidad significativamente superior a la habitual (el doble de la dosis diaria normal o más).

**PRECAUCIONES**

**Producto potencialmente hepatotóxico, que puede causar reacciones graves a la piel.**

Consumo de alcohol: Se debe evitar consumir alcohol, la combinación de este con paracetamol puede provocar serios problemas al hígado.

Embarazo: No se han demostrado mayores efectos adversos durante el embarazo, pero el medicamento debe ser indicado por su médico.

Lactancia: Aunque paracetamol pasa a la leche materna en pequeñas cantidades, no se han registrado problemas en lactantes cuya madre está usando Paracetamol. De cualquier modo, consulte con su médico la conveniencia de tomar este medicamento si está amamantando.

Uso en Niños: El uso de este medicamento en niños debe hacerse, previa consulta a su pediatra.

Ancianos: No se ha demostrado que en ancianos este medicamento cause efectos diferentes a los que produce en adultos. No es necesario modificar las dosis de ancianos sanos.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****GESIDOL COMPRIMIDOS 1 g**

Enfermedades: Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, corazón o cualquier otra enfermedad crónica severa.

En el caso particular de este medicamento, debe consultar con su médico si tiene diabetes y/o tiene un historial de abuso de alcohol.

**INTERACCIONES**

Medicamentos: El paciente debe consultar con el médico o farmacéutico la conveniencia de usar Paracetamol si está tomando otros medicamentos, dado a que algunos de estos, no pueden ser administrados al mismo tiempo con el Paracetamol. Otros pueden asociarse tomando ciertas precauciones.

Avísele a su médico o farmacéutico si alguno de los medicamentos que toma contiene: Ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros salicilados, cualquier antiinflamatorio no esterooidal, como ácido mefenámico, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, piroxicam, ketoprofeno, ketorolaco, naproxeno, entre otros. Anticoagulantes (como warfarina), fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, sulfapirazonas, isoniazida, nicotina o zidovudina.

Se recomienda precaución en pacientes asmáticos, sensibles al ácido acetilsalicílico, debido a que se han descrito ligeras reacciones broncoespásticas con paracetamol (reacción cruzada).

**EFFECTOS ADVERSOS**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de ocurrir debe acudir en forma inmediata al médico:

Reacción alérgica al paracetamol, que se presenta con rash, picazón, hinchazón, o dificultad para respirar; piel y ojos de color amarillo (indican daño hepático), dolor de garganta y fiebre (que no se han presentado antes del tratamiento, y que no responden a causas de la condición que se está tratando), hemorragias o moretones sin razón aparente, sangre en la orina, dolor, menor o mayor frecuencia al orinar.

Otros efectos:

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifica: fatiga o debilidad.

Este medicamento usado en forma crónica o en dosis muy elevadas puede provocar severo daño al hígado, por lo que no se recomienda usarlo en forma prolongada sin previa consulta a su médico.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**  
**GESIDOL COMPRIMIDOS 1 g**

**SOBREDOSIS**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: diarrea, pérdida del apetito, náuseas o vómitos, calambres o dolor estomacal, desmayos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad, a temperaturas inferiores a los 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**  
**No recomiende este medicamento a otra persona.**