

		ESPECIFICACION TECNICA	IMP.
NOMBRE PRODUCTO : GESIDOL 500 FOLLETO PACIENTE MEDIDAS : 126 x 122 mm COLOR : NEGRO TACA VISUAL : ESCALA : 1 : 1 PRODUCCION : TACAS DISTANCIA :	V°B° DISEÑO: <hr/> V°B° PRODUCT MANAGER: <hr/> V°B° DIRECTOR TECNICO: <hr/> REVISION FECHA: 18 / 01 / 2012		

NOTA: El archivo es válido sólo si su contenido es igual a esta impresión laser.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Gesidol®

Comprimidos 500 mg

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.
 Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
 Paracetamol 500 mg
 Excipientes: Celulosa microcristalina PH102, almidón glicolato de sodio, povidona K-90, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio c.s.

CLASIFICACION: Analgésico, antipirético.

Indicaciones:
 -Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada.
 -Estados febriles.

Usos
 ¿Qué debe saber antes de usar este medicamento? (Precauciones)
 Si usa este medicamento sin orden médica, solicite información de su farmacéutico y, lea con atención las instrucciones y precauciones que aparecen en este folleto, usted y su médico o farmacéutico deben considerar:
 Alergias: Si ha presentado alergias al paracetamol, aspirina o, a cualesquiera otras sustancias tales como alimentos, preservativos o colorantes.
 Embarazo: El paracetamol puede ser utilizado durante el embarazo en las dosis adecuadas, por corto tiempo y bajo control médico. No debe ser utilizado a dosis altas ni por períodos largos.
 Lactancia: Aunque el paracetamol pasa a la leche materna no causa problemas en el lactante, siempre y cuando se usen en las dosis correctas y por un tiempo corto.
 Niños: No se ha demostrado que en niños este medicamento cause efectos diferentes a los que produce en adultos. No obstante, no es recomendable utilizarlo por más de 10 días, ni en niños menores de 3 años, sin antes consultar con su médico.
 Ancianos: No se ha demostrado que en ancianos este medicamento cause efectos diferentes a los que produce en adultos.
 Otros medicamentos: Algunos medicamentos no pueden ser administrados al mismo tiempo con el paracetamol. Otros pueden asociarse tomando ciertas precauciones. Consulte con su médico o farmacéutico si el medicamento que está utilizando contiene:

-ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros salicilados	-ketoprofeno
-ácido melenámico	-ketorolaco
-ácido tiaprofenico	-meflofenamato
-diclofenaco	-nabumetona
-etodolaco	-naproxeno
-diflunisal	-oxaprozin
-fenilbutazona	-piroxicam
-fenoprofeno	-sulindaco
-fiocetafenina	-tenoxicam
-flurbiprofeno	-tolmetina
-ibuprofeno	
-indometacina	

Otras enfermedades: El uso del paracetamol no es conveniente en presencia de algunas enfermedades. En estos casos deben tomarse ciertas precauciones. Consulte con su médico si usted padece de:
 -Hepatitis u otra enfermedad del hígado
 -Abuso de alcohol
 -Enfermedad severa del riñón

Administración y dosis
 El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:
 -Adultos y niños mayores de 11 años: 325 o 500 mg cada 4 o 6 horas, según sea necesario, por un máximo de 5 días, si se usa para aliviar un dolor o, 3 días si se usa para controlar la fiebre. Si no hay mejoría o aparecen otros síntomas, consulte con su médico.
 No utilizar más de 4 gramos al día. En tratamientos largos, la dosis no debe ser mayor de 2,6 gramos diarios.
 Consulte con su farmacéutico para que le indique a cuántas tabletas corresponden esas dosis y en qué horario debe administrárselas.

Advertencias:
 Estas dosis sólo deben ser administradas por un máximo de 5 días si el paracetamol se usa para un dolor o, 3 días si se usa para controlar la fiebre. Si no hay mejoría o aparecen otros síntomas, consulte con su médico.
 En niños menos de 11 años no se debe utilizar más de 5 veces al día. Consulte con su farmacéutico para que le indique las cantidades exactas a las que corresponden esas dosis y en qué horario debe administrárselas.

El uso prolongado y/o la administración de altas dosis de paracetamol pueden provocar daño hepático severo.

Cumpla con el tratamiento indicado:
 Si utiliza este medicamento sin orden médica: siga las indicaciones de su farmacéutico. No utilice dosis mayores ni con más frecuencia. Esto puede aumentar el riesgo de aparición de efectos indeseados en el hígado.

Cuidados que debe tener:
 Bebidas alcohólicas: Evite tomar bebidas alcohólicas mientras está en tratamiento con este medicamento ya que aumenta el riesgo de causar daño en el hígado.

Pruebas de diagnóstico: El paracetamol puede alterar los resultados de ciertas pruebas de diagnóstico. Si usted requiere realizar alguna prueba de laboratorio, informe sobre sus tratamientos con este medicamento al médico encargado.

Diabetes: El paracetamol puede alterar los resultados de algunas pruebas de azúcar en la sangre. Consulte con su médico antes de cambiar la dieta o la dosis del medicamento que utiliza para la diabetes.

Otros medicamentos con paracetamol: Revise las etiquetas de todos los medicamentos que está utilizando. Si alguno contiene paracetamol, consulte con su médico. Emplear otras preparaciones que contengan paracetamol mientras utiliza este medicamento puede provocar síntomas de intoxicación por dosis excesivas.

Dosis excesivas: El paracetamol es un medicamento bastante seguro a las dosis indicadas, pero dosis muy elevadas pueden ser fatales. Algunos síntomas de haber utilizado dosis excesivas son: diarrea, aumento del sudor, pérdida del apetito, dolor o inflamación estomacal o abdominal. Si usted o alguna otra persona han tomado dosis excesivas, busque de inmediato ayuda de emergencia. Los signos de intoxicación pueden aparecer de 2 a 4 días después de administrar las dosis excesivas, pero el tratamiento para prevenir el daño en el hígado, o la muerte, deben comenzar inmediatamente.

Efectos adversos, efectos indeseables que pueden producir?
 Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de ocurrir debe acudir en forma inmediata al médico:
 Reacción alérgica al paracetamol, que se presenta con rash, picazón, hinchazón, o dificultad para respirar; piel y ojos de color amarillo (indican daño hepático), dolor de garganta y fiebre (que no se han presentado antes del tratamiento, y que no responden a causas de la condición que se está tratando), hemorragias o moretones sin razón aparente, sangre en la orina, dolor, menor o mayor frecuencia al orinar.

Otros efectos:
 Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifica: fatiga o debilidad.

Este medicamento usado en forma crónica o en dosis muy elevadas puede provocar severo daño al hígado, por lo que no se recomienda usarlo en forma prolongada sin previa consulta a su médico.

Sobredosis
 Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: diarrea, pérdida del apetito, náuseas o vómitos, calambres o dolor estomacal, desmayos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:
 Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.
 No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.

