KOIDE D

JARABE

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada 5 mL de jarabe contiene:	
Betametasona	0,25 mg
Dexclorfeniramina maleato	2,00 mg
Excipientes: Los aprobados en registro.	

¿PARA QUÉ SE USA?

Corticosteroide antihistamínico

Se usa para el tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas e inflamatorias rebeldes, agudas o crónicas.

CONTRAINDICACIONES.

No usar en caso de hipersensibilidad (alergia) a Dexclorfeniramina maleato, betametasona o a algún excipiente de la formulación. No usar en caso de infecciones micóticas, infecciones sistémicas, recién nacidos y prematuros, en pacientes recibiendo IMAO. Tuberculosis activa o no activa; poliomielitis y varicela, herpes simple ocular y cuadros de psicosis aguda. Diverticulitis, úlcera péptica activa o latente, afecciones cardiovasculares graves, diabetes mellitus, predisposición psicótica.

No usar durante el embarazo, salvo absoluta necesidad e indicación médica.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

- **Embarazo:** Este medicamento no se debe usar durante el embarazo. No debe tomar este medicamento sin antes comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. Se debe usar un método de control de la natalidad adecuada, durante el tratamiento con este medicamento. Este medicamento puede causar daño al feto y disminución en el crecimiento, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia:** Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al niño, por lo que debe consultar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

EFECTOS ADVERSOS. (No deseados)

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: retención de líquidos, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, debilidad muscular, fiebre, fatiga extrema, hemorragias, úlceras sangrantes en el recto, la boca y vagina, problemas de visión, aumento en la frecuencia para orinar heces negras o con sangre, calambres, sed, confusión, alucinaciones, convulsiones, insomnio, irritabilidad excesiva, ampollas en la piel, paranoia, euforia, depresión.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, espesamiento de las secreciones bronquiales, sequedad de garganta y boca, visión borrosa, dificultad para orinar, pérdida de apetito, náuseas, dolor de estómago leve, vértigo leve, nerviosismo, debilidad, indigestión, nerviosismo, redondeo de la forma de la cara, problemas en la menstruación, fragilidad en los huesos, aumento de la glucosa en sangre (aumento en la frecuencia para orinar, sed, náuseas, visión borrosa, fatiga), aumento de la presión arterial (mareos, enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, fatiga), calambres, mareos, dolor de cabeza, difícil cicatrización de heridas, piel frágil, dermatitis alérgica, moretones, aumento de la sudoración, edema, temblores.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

- **Mayores de 60 años:** Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento; que pueden ser dificultad para orinar, confusión, mareos, irritabilidad, sequedad de boca, nariz y garganta, por lo que se recomienda una especial vigilancia.

- **Consumo de alcohol:** Debe evitar tomar alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos tales como somnolencia, fatiga, irritación estomacal.

- **Manejo de vehículos:** Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, somnolencia y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Lactantes y niños:** Este medicamento puede retardar el crecimiento normal del niño, el pediatra debe evaluar el riesgo/beneficio de su administración.

- **Pacientes diabéticos:** Se debe tener precaución con pacientes diabéticos ya que este medicamento contiene sacarosa (equivalente a 2 g por cada 5 mL de jarabe).

- **Precauciones especiales:** No debe interrumpir bruscamente el tratamiento, su médico es quien le debe señalar a usted la forma de ir reduciendo la dosis en caso de que no necesite más el uso de este corticoide.

Su médico debe evaluar el uso de este medicamento si usted presenta alguno de los siguientes problemas médicos: insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, cálculos renales; además puede pedirle que visite periódicamente al oculista, ya que este medicamento puede producir alteraciones oculares.

Mientras esté en tratamiento debe evitar el contacto con personas que presentan varicela o sarampión, en caso de sospecha de contagio debe avisar a su médico inmediatamente.

Este medicamento puede producir un alza de los niveles de glucosa en la sangre y de la presión arterial, por lo que debe estar bajo control médico frecuente.

Durante el tratamiento y un tiempo después (según estime su médico) no se vacune sin el consentimiento de su médico, debe evitar además el contacto con personas que hayan recibido la vacuna oral contra el virus de la polio.

Este medicamento puede dar positivo en el control del dopaje en deportistas.

Antes de hacerse un examen de alergia a la piel debe avisarle al profesional de la salud a cargo que usted está tomando este medicamento.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

- Si ha presentado síntomas de alergia a dexclorfeniramina y/o betametasona.
- Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.
- Este medicamento no debe ser usado en pacientes recién nacidos o bebés prematuros.
- No se debe usar en pacientes que presenten infecciones micóticas y sistémicas, herpes de la córnea u ocular simple, úlcera gastroduodenal activada, tuberculosis activa o no activa, psicosis aguda, diabetes severa, afecciones cardiovasculares graves y enfermedades virales como la poliomielitis y varicela.
- No se debe administrar este medicamento a enfermos que estén recibiendo inhibidores de la monoaminoxidasa.

-No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

-No repita el tratamiento sin indicación médica.

-No recomiende este medicamento a otra persona.

-Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

- **Medicamentos:** Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: Antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anticoagulantes orales, anticolinérgicos como atropina, butilescopolamina,

antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, clomipramina, antidepresivos como moclobemida, tranilcipromina, medicamentos que contengan alcohol, bepridil, carbamazepina, fenitoína u otro medicamento para tratar la epilepsia, ciclosporina, teofilina, rifampicina, isoniazida, glibenclamida, digoxina u otros glucósidos cardíacos, salicilatos, indometacina, colestiramina, vacunas y toxoides.

- **Enfermedades:** Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de úlcera estomacal, obstrucción intestinal, hipertiroidismo, asma, dificultad para orinar y glaucoma, de enfermedad cardíaca congestiva, miastenia gravis, gastritis, diabetes, tuberculosis e infecciones generales por hongos, sarampión y SIDA.

- **Alimentos:** Este medicamento puede aumentar la retención de sodio, por lo cual debe evitar consumir sodio (sal) en exceso.

- **Exámenes de laboratorio:** Puede producir alteraciones en los resultados de los análisis de colesterol, glucosa, calcio, potasio y hormonas tiroideas en sangre, de glucosa en orina, y las pruebas cutáneas de tuberculina, por lo que debe avisar que se encuentra en tratamiento con este medicamento antes de realizarse algún examen.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

-**Adultos y niños mayores de 12 años:** la dosis inicial es de 1 a 2 cucharaditas (5-10 mL) 4 veces al día, sin exceder la cantidad de 8 cucharaditas diarias (40 mL) de jarabe.

-**Niños de 6 a 12 años:** la dosis usual es de ½ cucharadita (2.5 mL) 3 veces al día sin exceder las 4 cucharaditas al día (20 mL) de jarabe.

-**Niños de 2 a 6 años:** la dosis usual es de un ¼ a ½ cucharadita (1,25 a 2,5 mL) 3 veces al día, sin exceder las 3 cucharaditas al día (1 cucharadita: 5 mL = 15 mL) de jarabe.

Consejo de cómo administrarlo

Puede tomarlo en conjunto con comidas o leche. Puede utilizar dulces o goma de mascar para evitar la sequedad bucal.

Si su tratamiento es prolongado debe llevar una dieta baja en sal, enriquecida en potasio y proteínas.

Este medicamento debe administrarse con una cucharadita debidamente graduada o con otros dispositivos con marcas, a 5 mL, 2,5 mL y 1,25 mL de jarabe.

- Uso prolongado

Usted puede necesitar una terapia a largo plazo, pero debe ser con control médico frecuente, ya que se pueden presentar efectos adversos serios: cataratas, diabetes, hipertensión, osteoporosis.

SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: somnolencia marcada, pupilas dilatadas, excitabilidad excesiva, confusión, pérdida de la coordinación, pulso debilitado, pérdida de conciencia, fiebre, dolor muscular, náuseas, mareos, fatiga, dificultad para respirar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

ALMACENAMIENTO.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.

Conservar el frasco bien tapado y a temperatura ambiente a no más de 30°C.

PRESENTACIÓN.

Frasco con X mL de Koide D de jarabe.