

MAREAMIN

COMPRIMIDOS 100 mg

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada comprimido contiene:	
Dimenhidrinato	100,0 mg
Excipientes: Los aprobados en registro.	c.s.

INDICACIONES.

Antiemético y Antivertiginoso

Se utiliza para evitar el mareo producido por el movimiento.

CONTRAINDICACIONES.

Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a Dimenhidrinato.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Niños menores de 2 años

Porfiria

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

- **Mayores de 60 años:** Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento; que pueden ser dificultad para orinar, confusión, mareos, irritabilidad, sequedad de boca, nariz y garganta, por lo que se recomienda una especial vigilancia.

- **Consumo de alcohol:** Debe evitar tomar alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos tales como somnolencia, fatiga.

- **Manejo de vehículos:** Este producto produce somnolencia y disminuye su estado de alerta. Si está tomando este medicamento no debe conducir un vehículo, manejar maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos.

- **Embarazo:** Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia:** Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando, ya que Dimenhidrinato puede causar excitación o irritabilidad en el lactante.
 - **Lactantes y niños:** Los niños son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño. En niños se puede presentar hiperexcitabilidad.
 - **Precauciones especiales:** Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos. Antes de hacerse un examen de alergia a la piel debe avisarle al profesional de la salud a cargo que usted está tomando este medicamento.
 - No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
 - No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
 - No recomiende este medicamento a otra persona.
- “Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes intolerantes a la lactosa”.**

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente metoclopramida, azitromicina, claritromicina, eritromicina, itraconazol, ketoconazol, clorpromazina, procainamida, quinidina, amitriptilina, clomipramina, desipramina, isocarboxazida, benzodiazepinas, carbamazepina, fenitoina.

Medicamentos ototóxicos: El uso simultáneo de medicamentos ototóxicos con antihistamínicos puede enmascarar los síntomas de ototoxicidad como tinnitus o vértigo.

- Enfermedades:

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de hipertrofia prostática, dificultad para orinar, glaucoma, antecedentes de arritmias cardiacas, asma.

- Alimentos:

El consumir alimentos que contengan alcohol puede provocar un aumento de los efectos adversos del medicamento.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados).

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor de garganta o fiebre, hemorragias o moretones inusuales, cansancio inusual, visión borrosa, mareos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al

medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifican: somnolencia, sequedad de boca, garganta, nariz, pérdida del apetito, irritabilidad.

SOBREDOSIS.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: convulsiones, somnolencia severa, sequedad de garganta, boca y nariz, palidez, alucinaciones, dificultad para respirar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

- Rango y frecuencia:

Dosis adultas: 50 a 100 mg cada 4 - 6 horas. Máximo 400 mg al día.

- Consejo de cómo administrarlo:

Se recomienda tomar la primera dosis 30 minutos antes de viajar y las siguientes cada 4 horas.

- Uso prolongado:

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

ALMACENAMIENTO.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.

PRESENTACIÓN.

Estuche de Mareamin 100 mg con 20 comprimidos.