

MIO - RELAX

Comprimidos Recubiertos 10 mg

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene:	
Ciclobenzaprina Clorhidrato	10,0 mg
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Relajante muscular

Este medicamento es utilizado para el alivio de espasmos musculares asociado a condiciones agudas dolorosas músculo esquelético.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a la Ciclobenzaprina y/o a sus excipientes. Glaucoma. Retención urinaria. Uso simultáneo con inhibidores de la MAO. Fase aguda post infarto de miocardio. Pacientes con arritmias cardíacas, bloqueo o alteraciones de la conducción; insuficiencia cardíaca congestiva. Hipertiroidismo.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

-Embarazo: Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

-Lactancia: Se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna. Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados).

-Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: Retención de orina, confusión, dolor muscular, temblor, alucinaciones, depresión, dificultad para respirar, taquicardia.

-Otros efectos: Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos

persisten o se intensifican: somnolencia, sequedad de boca, mareos, debilidad, fatiga, hormigueos, mal sabor de boca, visión borrosa, insomnio, dolor de cabeza, estreñimiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Debe usarse con precaución en pacientes con presión intraocular aumentada, epilepsia, insuficiencia hepática o renal, hipertensión.

-Mayores de 60 años: Los ancianos deberán recibir una especial vigilancia durante el tratamiento con Ciclobenzaprina, ya que en ellos los efectos adversos se pueden ver acentuados.

-Consumo de alcohol: Debe evitar el consumo de alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que éste acentúa los efectos adversos de Ciclobenzaprina.

-Manejo de vehículos: Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, somnolencia y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. No se aconseja manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa bajo su efecto.

-Lactantes y niños: No se recomienda el uso de Ciclobenzaprina en menores de 15 años, a menos que su médico lo indique.

-Precauciones especiales: La suspensión del tratamiento debe realizarla poco a poco, según las indicaciones de su médico, ya que de lo contrario podría presentar malestar general, dolor de cabeza y náuseas. Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos. Si ha estado o está en tratamiento con antidepressivos como tranilcipromina, moclobemida; deberá esperar al menos 14 días antes de iniciar el tratamiento con Ciclobenzaprina. Este medicamento puede necesitar un ajuste de dosis en pacientes que tienen deterioro hepático severo, consulte con su médico si usted padece de algún tipo de daño al hígado.

-Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos: Si ha presentado síntomas de alergia a Ciclobenzaprina. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

-Medicamentos: Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: guanetidina, imipramina, nortriptilina, sertralina, fluoxetina, clorpromazina, tioridazina, clorfenamina, clemastina, fenobarbital, tranilcipromina, moclobemida.

-Enfermedades: Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de arritmias,

hipertiroidismo o ha sufrido un infarto al miocardio recientemente, glaucoma, problemas para orinar.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: Adulto y niños mayores de 15 años, 5 mg tres veces al día. Basado en la respuesta individual del paciente, la dosis puede ser aumentada a 10 mg tres veces al día.

En pacientes ancianos o con insuficiencia hepática se debe usar dosis reducida o disminuir la frecuencia de administración, la dosis máxima diaria recomendada es 60 mg al día.

-Consejo de cómo administrarlo: Lo puede tomar antes, durante o después de las comidas sin problemas; debe tomar el medicamento acompañado con un vaso de agua.

-Uso prolongado: En general se recomienda que utilice el medicamento por períodos cortos a menos que su médico indique lo contrario.

SOBREDOSIFICACIÓN.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: convulsiones, somnolencia severa, desmayos o latidos cardiacos rápidos o irregulares, respiración dificultosa, alucinaciones, aumento o disminución de la temperatura corporal, rigidez muscular inexplicable, nerviosismo, vómitos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

ALMACENAMIENTO.

Mantenga en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

Mantenga fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

PRESENTACIÓN.

Envase con 10 comprimidos recubiertos 10 mg de Mio-Relax.