

NOSCAPINA

JARABE 50 mg/5mL

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada 100 mL de jarabe contiene:	
Noscapina	0,10 g
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Antitusivo

Este medicamento es usado para el alivio sintomático de tos no productiva debida a irritaciones leves de garganta y bronquios que aparecen con el resfrío y la inhalación de irritantes.

CONTRAINDICACIONES.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

- Si ha presentado síntomas de alergia a Noscapina.
- Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.
- En el caso que padezca de tos asmática o insuficiencia respiratoria (caracterizada por cansancio extremo o inusual).

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

- **Embarazo:** Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.
- **Lactancia:** Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: broncoconstricción, hipotensión transitoria, constipación.

- **Otros efectos:** Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifican: ligera somnolencia, mareos, dolores de cabeza, náuseas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Antes de usar este medicamento deben evaluarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los siguientes aspectos:

- **Mayores de 60 años:** En pacientes ancianos se recomienda utilizar la mitad de la dosis según la indicación de su médico, y observar que no se presenten síntomas como cansancio extremo o dificultad para respirar, en este caso se recomienda que deje de tomar el medicamento.

- **Consumo de alcohol:** No debe consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos de Noscapina.

- **Manejo de vehículos:** Este medicamento puede causar en algunas personas somnolencia, mareos y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Precauciones especiales:** Este medicamento sólo alivia la tos asociada a irritaciones leves de garganta, debe consultar con su médico si observa aparición de flemas, fiebre por más de dos días, cansancio o dificultad para respirar, sudoración nocturna o cualquier otro síntoma distinto o exagerado respecto a un resfrío común.

INTERACCIONES.

- **Medicamentos:** Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente diazepam, alprazolam, fenobarbital, morfina.

- **Enfermedades:** Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de glaucoma, asma, retención urinaria o cualquier enfermedad relacionada con el sistema respiratorio.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso en particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Rango y frecuencia:** Dosis adultos: 15 a 20 mg cada 4 horas. Dosis niños: 5 mg cada 4 horas.

- **Consejo de cómo administrarlo:** En el caso de los comprimidos, debe tomarlos con abundante líquido, cuando se trata de jarabes debe tomarlo con la cuchara de dosificación que adjunte el envase, de lo contrario lo más recomendable es que utilice una jeringa sin aguja (limpia, sin uso previo) para administrar la dosis exacta.

- **Uso prolongado:** Si la tos persiste después de 3 días de tratamiento, debe suspender el medicamento y consultar a su médico.

No debe usar este medicamento en forma prolongada o repetida sin consultar con su médico.

SOBREDOSIS.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dificultad respiratoria, mareos, náuseas, desvanecimientos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

ALMACENAMIENTO.

Mantenga en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN.

Frasco con 100 mL de Noscapina Jbe.