

PIETRA ED

Comprimidos Recubiertos 2 mg

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene:	
Dienogest	2,0 mg
Excipientes: Los aprobados en registro	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Tratamiento de la Endometriosis

Este medicamento contiene la hormona Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, para el tratamiento de la endometriosis (migración y crecimiento del tejido de la pared interna del útero fuera de la cavidad uterina). La ingestión de un comprimido por día de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, lleva a la reducción del tejido afectado (endometrio) y reduce los síntomas asociados, como, por ejemplo, dolor pélvico y sangrados menstruales dolorosos.

ACCIÓN DEL MEDICAMENTO

La sustancia activa de este medicamento, Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, es una hormona que actúa reduciendo la producción y la acción de otra hormona del organismo, el estradiol, en el endometrio (capa de tejido que recubre la pared interna del útero), llevando a la reducción de la producción de células del tejido afectado (endometrio).

CONTRAINDICACIONES.

Usted no debe tomar Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, si presenta cualquiera de las condiciones descritas abajo. Si usted presenta alguna de las condiciones a descritas a continuación, consulte a su médico antes de iniciar el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg.

- Si usted presenta coágulos (disturbio tromboembólico) sanguíneos. La trombosis es la formación de un coágulo que puede ocurrir, por ejemplo, en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda) y en los vasos de los pulmones (embolia pulmonar) (ver Advertencias y Precauciones).

- Si usted tiene o ya tuvo enfermedad arterial grave, incluyendo enfermedad cardiovascular, como ataque del corazón (infarto), derrame o enfermedad del corazón que cause disminución del suministro de oxígeno al corazón (angina pectoris) (¿vea también el apartado "Lo que debo saber antes de usar este medicamento?").
- Si usted tiene diabetes mellitus con lesión de vasos sanguíneos.
- Historia actual o anterior de enfermedad grave del hígado (cuyos síntomas pueden ser amarillado de la piel o picazón en todo el cuerpo) y su hígado aún no funciona normalmente.
- Presencia o antecedente de tumor en el hígado (benigno o maligno).
- Historia actual o anterior de cáncer que puede desarrollarse bajo la influencia de hormonas sexuales (por ejemplo, cáncer de mama o de los órganos genitales).
- Presencia de sangrado vaginal de causa desconocida.
- Si usted es alérgica a la sustancia activa de este medicamento o a cualquiera uno de sus componentes.

Si alguna de estas condiciones aparece por la primera vez durante el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, detenga la administración del medicamento y consulte a su médico inmediatamente.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

Embarazo: Embarazo categoría X – Efectos teratogénicos: Pitavastatina está contraindicada en mujeres embarazadas o que pueden quedar embarazadas. La Pitavastatina puede causar daño fetal cuando es administrado en mujeres embarazadas. Si la paciente queda embarazada mientras está tomando este medicamento, la paciente debe ser informada de los riesgos potenciales para el feto y de la ausencia de beneficios clínicos conocidos con el uso continuado durante el embarazo.

Este medicamento causa malformación al bebé durante el embarazo.

Lactancia: No se sabe si la Pitavastatina es excretada en la leche materna humana, sin embargo, fue demostrado que una pequeña cantidad de otras drogas de esta clase pasa a la leche materna. Las mujeres que requieren tratamiento con Pitavastatina deben ser aconsejadas a no amamantar sus bebés o a suspender el uso de este medicamento (**Ver Contraindicaciones**).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Advertencias:

En este prospecto están descritas situaciones en las que el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, debe ser discontinuado, y otras que puede haber disminución de su eficacia.

Con base en los datos científicos disponibles, la ovulación es inhibida en la mayoría de las pacientes durante el tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg. Sin embargo,

Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, no es un contraceptivo. Para evitar el embarazo durante el tratamiento con el producto, debe evitar las relaciones sexuales o utilizar adicionalmente un método contraceptivo no hormonal, como, por ejemplo, preservativo u otro método de barrera (ver "Otras condiciones"). No utilice el método de ritmo o de la temperatura, pues estos métodos pueden no ser eficaces, una vez que Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, modifica las variaciones de la temperatura y del moco cervical que ocurren durante el ciclo menstrual.

Si Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg es utilizado en presencia de cualquiera de las condiciones enlistadas abajo, necesitará ser mantenida bajo cuidadosa observación. Hable con su médico.

Informe a su médico antes de iniciar el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg si usted presenta cualquier una de las condiciones a continuación:

- si usted ya presentó tromboembolismo venoso o algún familiar directo presentó trombosis (tromboembolismo venoso en un hermano o pariente de edad relativamente joven);
- si usted fuma;
- si usted tiene sobrepeso;
- si algún familiar directo tuvo cáncer de mama;
- si usted tiene depresión;
- si usted tiene presión arterial alta o desarrolla presión arterial alta durante el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg;
- si usted desarrolla enfermedad del hígado mientras esté tomando Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg. Los síntomas pueden incluir amarillado de la piel o de los ojos, o picazón en todo el cuerpo. Informe a su médico si usted presentó estos síntomas durante un embarazo anterior;
- si usted tiene diabetes o tuvo diabetes temporariamente durante embarazo anterior;
- si usted ya tuvo cloasma (manchas oscuras en la piel, particularmente en el rostro); en este caso, evite exposición al sol o rayos ultravioleta;
- si usted tuvo un embarazo ectópico (si el embrión se desarrolló fuera del útero) o si usted presenta función alterada de las trompas de Falopio (tubas uterinas).

Si alguna de las condiciones arriba aparece por primera vez, ocurre nuevamente o desmejora durante el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, consulte a su médico.

- Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg y trombosis.

Trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo que puede bloquear una vena o una arteria (llamado de embolia).

La trombosis ocurre algunas veces en las venas profundas de las piernas (trombosis venosa profunda). Si un coágulo se desplaza de las venas donde fue formado, puede alcanzar y

bloquear las arterias de los pulmones, causando la llamada "embolia pulmonar". La trombosis venosa profunda es de ocurrencia rara, pero puede ser desarrollada mientras usted esté tomando Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg. También puede ocurrir durante el embarazo. El riesgo de tromboembolismo parece ser un poco más elevado en usuarias de medicamentos con hormona (progestógenos) comparables a Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg que, en no usuarias, pero este riesgo no es tan elevado como el riesgo durante la gestación.

El riesgo de tromboembolismo aumenta, por ejemplo:

- con el aumento de la edad;
- si usted está con sobrepeso;
- si usted tiene tromboembolismo;
- si algún familiar directo tuvo trombosis venosa (tromboembolismo en un hermano o pariente de edad relativamente joven).

El riesgo de presentar trombosis venosa profunda es temporariamente aumentado como resultado de una cirugía o inmovilización prolongada (por ejemplo, cuando usted queda en cama con las piernas enyesadas). Mujeres en uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg pueden presentar riesgo aún mayor. Informe a su médico que usted está utilizando Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, en caso de cualquier hospitalización o cirugía programada. Su médico podrá pedir la interrupción del tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg algunas semanas antes de la cirugía o del tiempo previsto de inmovilización. Su médico también va a informar cuando usted puede empezar a tomar Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, nuevamente, después de su recuperación.

El riesgo de tromboembolismo también está aumentado después del parto.

Pueden ocurrir coágulos muy raramente en venas del corazón (causando ataque cardíaco o infarto) o del cerebro (causando derrame).

Estudios muestran que hay pequeña o ninguna evidencia para la asociación entre medicamentos con progestágenos como Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, y el riesgo aumentado de ataque del corazón o derrame. El riesgo de estos eventos está más relacionado al aumento de la edad, hipertensión y tabaquismo. En mujeres con hipertensión, el riesgo de derrame puede ser un poco aumentado por medicamentos con progestágenos, como Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg.

Si usted desarrolla presión arterial alta durante el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, hable con su médico.

La trombosis puede, muy ocasionalmente, causar deficiencias serias y permanentes o ser fatal.

Si usted nota señales posibles de trombosis, detenga la administración de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg y consulte inmediatamente su médico.

- Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg y cáncer:

Los siguientes hallazgos relativos a contraceptivos orales combinados ("píldora") pueden ser verdaderos también para las usuarias de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, aunque la evidencia no sea conclusiva para medicamentos con progestágenos, como Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comparado con contraceptivos orales combinados ("píldoras").

El cáncer de mama fue diagnosticado con frecuencia levemente mayor en mujeres usuarias de píldora que en mujeres de la misma edad no usuarias de píldora. Este aumento en número de diagnósticos de cáncer de mama desaparece gradualmente a lo largo de los 10 años después de la interrupción del uso de la píldora. No se sabe si la diferencia es causada por la píldora. Es posible que las mujeres hayan sido examinadas con mayor frecuencia y por eso el cáncer de mama fue diagnosticado más precozmente.

En casos raros, tumores del hígado y, aún más raramente, tumores malignos del hígado fueron relatados en usuarias de píldora. Estos tumores pueden llevar a sangramiento interno. Consulte su médico inmediatamente si usted presentar dolor severo en el abdomen.

- Alteraciones en los estándares de sangramiento.

- El tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, altera la calidad del sangramiento menstrual en la mayoría de las mujeres (vea el apartado "¿Cuáles los males que este medicamento me puede causar?").

El sangramiento uterino, por ejemplo, en mujeres con útero adenomiosis o leiomiomatosis, puede ser agravado con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg. Si el sangramiento es intenso y continuo, puede ocurrir anemia (grave en algunos casos). En este caso, consulte su médico.

-No use este producto después de la fecha de vencimiento en el envase.

-No repita el tratamiento sin antes consultar con su médico.

-No recomiende este medicamento a otra persona.

-Mantener fuera del alcance de los niños.

- Otras condiciones

-Este medicamento contiene lactosa, por lo tanto, debe utilizarse con precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa.

-Una vez que Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg no debe ser utilizado durante el embarazo, debe utilizar métodos no-hormonales de contracepción (método de barrera, por ejemplo, preservativo) para prevenir el embarazo. Usted no debe utilizar contraceptivos conteniendo hormonas sexuales de ninguna forma (comprimido, adhesivo, sistema intrauterino) mientras esté usando Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg.

Si excepcionalmente usted queda embarazada durante el uso de Dienogest comprimidos

recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, existe una mayor probabilidad en usuarias de medicamentos con progestágenos, como Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg. de ocurrir un embarazo extrauterino (cuando el embrión se desarrolla fuera del útero). Informe su médico antes de iniciar el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, o en el caso que usted ya haya tenido un embarazo extrauterino o presenta función alterada de las tubas uterinas.

Si usted presenta quejas abdominales de causa desconocida que sean diferentes de los síntomas de endometriosis que usted ya tiene comúnmente, consulte inmediatamente a su médico, pues se debe considerar la posibilidad de un embarazo extrauterino.

Folículos ováricos persistentes (frecuentemente referidos como "quistes ováricos funcionales") pueden ocurrir durante el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg. La mayoría de estos folículos no está asociada a cualquier síntoma. En caso de quejas abdominales diferentes de los síntomas de endometriosis que usted tiene comúnmente, consulte inmediatamente su médico. En la mayoría de los casos los folículos aumentados desaparecen espontáneamente durante 2 o 3 meses de observación.

- Cuando usted debe consultar su médico Exámenes regulares durante el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, su médico va a pedir su retorno para realizar exámenes regulares.

Consulte su médico si:

- nota cualesquiera alteraciones en su salud, especialmente desarrollando cualquiera de las alteraciones mencionados en este prospecto (vea también el apartado "¿Cuándo no debo usar este medicamento?" y "¿Lo qué debo saber antes de usar este medicamento?"; no se olvide de los apartados relacionados a sus familiares directos);
- si usted siente un bulto en la mama;
- si usted va a utilizar otros medicamentos (vea el apartado "Interacciones Medicamentosas");
- si usted quedará inmovilizada o será sometida a una cirugía (consulte su médico por lo menos 4 semanas antes);
- si usted presenta sangramiento vaginal intenso no usual;
- si usted cree que está embarazada; (no inicie la próxima caja antes de hablar con su médico);
- si usted presenta quejas abdominales, especialmente si son diferentes de los síntomas de endometriosis que usted tiene comúnmente, consulte inmediatamente su médico, pues se debe considerar la posibilidad de un embarazo extrauterino o sangramiento interno de un tumor del hígado.

Deje de tomar Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg y consulte su médico inmediatamente si usted nota posibles señales de trombosis, tales como:

- tos común;
- dolor severo en el pecho que puede irradiar para el brazo izquierdo;

- falta de aire;
- cualquier cefalalgia infrecuente, severa y prolongada o crisis de jaqueca;
- pérdida parcial o completa de la visión, o visión duplicada;
- tartamudeo o dificultad para hablar;
- alteraciones repentinas en la capacidad a oír, sentir olor o sabor;
- mareos o desmayo;
- debilidad u hormigueo de cualquier parte del cuerpo;
- dolor severo en el abdomen;
- dolor severo o hinchazón de cualquiera una de las piernas.

- Embarazo y amamantamiento

Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, no debe ser utilizado por mujeres embarazadas, pues no hay necesidad de tratar la endometriosis durante el embarazo.

El tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg durante el amamantamiento no es recomendado. Datos disponibles indican que Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg es excretado en la leche materna.

Se debe decidir sobre la discontinuación del amamantamiento o del tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg considerando los beneficios del amamantamiento para el niño y los beneficios del tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg para la mujer. Con base en los datos disponibles, la ovulación es inhibida en la mayoría de las pacientes durante el tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, sin embargo, Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, no es un contraceptivo. Se debe utilizar un método contraceptivo no- hormonal como medio de prevención del embarazo (vea el apartado "Otras condiciones").

Basado en datos disponibles, el ciclo menstrual regresa al normal dentro de 2 meses después del fin del tratamiento con Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg.

Hable con su médico o farmacéutico para orientaciones antes de usar Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, o cualquiera otro medicamento.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados).

Como todos los medicamentos, Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg puede causar efectos indeseables, aunque no todas las personas presenten estos efectos. Las reacciones adversas pueden ser más frecuentes durante los primeros meses después del inicio de la ingestión de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, y generalmente desaparecen con la continuidad del uso. Aunque su flujo menstrual pueda permanecer inalterado, usted también puede presentar alteraciones en su calidad de sangramiento, como, por ejemplo, sangramiento frecuente, poco frecuente, irregular, prolongado o este puede ser interrumpido completamente.

Si ocurre agravación de cualquiera una de las reacciones adversas, o usted nota algún efecto que no esté descrito en este prospecto, informe a su médico.

A continuación, son descritas las reacciones adversas en orden de frecuencia que pueden ocurrir:

Frecuente (puede afectar entre 1 e 10 a cada 100 usuarias):

- aumento de peso;
- humor deprimido, problemas para dormir, nerviosismo, disminución del deseo sexual o humor alterado;
- dolor de cabeza o jaqueca;
- náusea, dolor abdominal, gases, barriga hinchada o vómito;
- acné o pérdida de pelo;
- dolos de espalda;
- desconfort en las mamas, quiste ovárico o sofocos;
- sangrado vaginal/uterino, incluye goteo;
- debilidad (condiciones asténicas) o irritabilidad.

Poco frecuente (puede afectar entre 1 y 10 a cada 1.000 usuarias):

- anemia;
- pérdida de peso o aumento del apetito;
- ansiedad, depresión u oscilación de humor;
- desequilibrio del sistema nervioso autónomo (controla funciones involuntarias del organismo, por ejemplo, la transpiración) o atención alterada;
- resecado de los ojos;
- zumbido;
- problemas inespecíficos en la circulación o palpitos;
- presión arterial baja;
- respiración corta o rápida;
- diarrea, constipación, desconfort abdominal, inflamación del estómago e intestino (inflamación gastrointestinal), inflamación de la encía (gingivitis);
- resecado de la piel, sudor excesivo, picazón por todo el cuerpo, modelo masculino de crecimiento del vello (hirsutismo), uñas débiles, caspa, dermatitis, crecimiento anormal del cabello, reacción de sensibilidad a la luz o problemas en la pigmentación de la piel;
- dolor de huesos, espasmos musculares, dolor o sensación de peso en los brazos, manos, piernas o pies;
- infección del trato urinario;
- candidiasis vaginal, resecado de la región genital, flujo vaginal, dolor pélvico, inflamación atrófica de los genitales con flujo (vulvovaginitis atrófica) o bulto en las mamas (masa en las mamas, enfermedad fibrocística de las mamas, endurecimiento de las mamas);
- hinchazón debida a la retención de líquidos.

INTERACCIONES.

Siempre informe a su médico cuales medicamentos o productos fitoterápicos usted está usando. También informe a su médico, farmacéutico o dentista que usted está tomando Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg.

El efecto de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, puede ser reducido por medicamentos con Hierba de San Juan/hipérico y medicamentos usados para el tratamiento de:

- epilepsia (por ejemplo, fenitoína, barbitúricos, primidona, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato);
- tisis (por ejemplo, rifampicina);
- infecciones por VIH: inhibidores no nucleosídeos de la transcriptasa reversa (por ejemplo, nevirapina);
- otras infecciones (antibióticos, tales como griseofulvina).

Los niveles de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, en la sangre pueden aumentar con el uso de los siguientes medicamentos y sustancias:

- antifúngicos (por ejemplo, cetoconazol, itraconazol, fluconazol);
- antibióticos (eritromicina, claritromicina y roxitromicina);
- antidepresivos (por ejemplo, nefazodona, fluvoxamina, fluoxetina);
- antiácidos (por ejemplo, cimetidina);
- medicamentos para presión arterial (por ejemplo, diltiazem, verapamil);
- inhibidores de la proteasa para infecciones por VIH (por ejemplo, ritonavir, saquinavir, indinavir o nelfinavir);
- jugo de naranja/pomelo.
- Ingestión concomitante de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, con alimentos y bebidas.

Este medicamento puede ser tomado con o sin alimentos, con un poco de líquido, si necesario.

- Otras interacciones

El uso de progestágenos puede influenciar los resultados de ciertos exámenes de laboratorio. Informe al laboratorio que usted usa Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg y coménteles a su médico.

- Dificultad para dirigir vehículos u operar máquinas no fueron observados.

Informe a su médico o cirujano dentista si usted está haciendo uso de algún otro medicamento.

No use medicamento sin el conocimiento de su médico. Puede ser peligroso para su salud.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

La dosis debe ser indicada por su médico tratante, así como la duración del tratamiento, no obstante, la dosis y las recomendaciones generales son:

La dosis de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg es de un

comprimido por día sin intervalo de pausa, tomado, preferencialmente, a la misma hora todos los días, con un poco de líquido, si es necesario. Los comprimidos deben ser tomados continuamente, independientemente del sangramiento vaginal. Por lo tanto, al término de una caja, otra debe ser iniciada a continuación, sin interrupción.

La ingestión de los comprimidos de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, puede ser iniciada en cualquier día del ciclo menstrual.

Informaciones adicionales para poblaciones especiales:

- Niños y adolescentes: Este medicamento no es indicado para niñas antes de la menarquia. La seguridad y eficacia de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg en adolescentes (menarquia a 18 años) aún no ha sido establecida.

- Mayores (65 años o más): No hay indicación relevante para el uso de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg en mayores.

- Pacientes con alteración del funcionamiento del hígado: Este medicamento no debe ser utilizado en pacientes que presenten grave alteración de la función del hígado (vea el apartado "¿Cuándo no debo usar este medicamento?").

- Pacientes con alteración del funcionamiento de los riñones: No hay datos que sugieran la necesidad del ajuste de dosis en pacientes con alteración de la función de los riñones.

- ¿Lo qué debo hacer en caso de disturbios gastrointestinales (en el estómago y en los intestinos), cómo vómito o diarrea intensa?: Si ocurre vómito o diarrea intensa, la sustancia activa del comprimido puede no haber sido absorbida completamente. Si ocurre vómito en el período de 3 a 4 horas después de la ingestión del comprimido, es como si usted hubiese olvidado de tomarlo. Por lo tanto, siga el mismo procedimiento indicado en el apartado

- "¿Lo qué debo hacer cuándo me olvide de usar este medicamento?": Consulte su médico en cuadros de diarrea intensa.

Siga la orientación de su médico, respetando siempre las horas, las dosis y la duración del tratamiento. No interrumpa el tratamiento sin el conocimiento de su médico.

Este medicamento no debe ser partido, abierto o masticado.

En caso de olvidar una dosis:

La eficacia de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg puede estar reducida en caso de olvido de la toma de los comprimidos, vómito o diarrea (si ocurre dentro de 3 a 4 horas después de la ingestión de un comprimido). En caso de que se olvide de tomar un comprimido, la mujer debe tomar un comprimido a penas se acuerde, y continuar el día siguiente en la hora habitual. Un comprimido no absorbido debido a vómito o diarrea debe ser igualmente sustituido por otro comprimido.

Si usted interrumpe la ingestión de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, sus quejas originales de endometriosis pueden ocurrir nuevamente. En caso de dudas, busque orientación del farmacéutico o de su médico, o cirujano dentista.

SOBREDOSIFICACIÓN

Usted no debe tomar más comprimidos de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, que la cantidad indicada por su médico.

No hubo relatos de efectos perjudiciales graves de la ingestión de muchos comprimidos de Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, de una sola vez. No hay antídoto específico. Si usted descubre que un niño tomó Dienogest comprimidos recubiertos 2 mg, comprimidos recubiertos 2 mg, busque a su médico.

En caso de uso de gran cantidad de este medicamento, busque rápidamente ayuda médica y lleve el embalaje o prospecto del medicamento, si posible.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

El producto debe ser conservado en temperatura ambiente (entre 15 y 30°C) y protegido de la luz y humedad.

PRESENTACIÓN.

Estuche de con X comprimidos recubiertos de Pietra ED 2 mg.