

TRICOLON SIMPLE

Solución para Gotas Orales

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada mL de solución para gotas orales contiene:	
Pargeverina Clorhidrato	5,0 mg
Excipientes: Los aprobados en registro	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Tratamiento de espasmos de origen intestinal, biliar, renal y del aparato genito-urinario.

CONTRAINDICACIONES.

Usted no debe tomar este medicamento si ha presentado síntomas de hipersensibilidad a Pargeverina o a cualquier excipiente de la formulación.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

Embarazo: Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia: Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

Lactantes y niños: Se debe utilizar con precaución en niños; bajo la indicación y control de su pediatra.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: retención urinaria, visión borrosa, taquicardia, dolores de cabeza, mareos, insomnio, reacciones alérgicas.

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste se intensifican: sequedad bucal, estreñimiento, dilatación de la pupila con pérdida de la acomodación y fotofobia leve.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Mayores de 60 años: Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con Pargeverina.

Consumo de alcohol: Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que se pueden ver intensificados los efectos adversos de Pargeverina.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Medicamentos: Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: clorfenamina, hidroxicina, loratadina, amitriptilina.

Enfermedades: Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de glaucoma de ángulo abierto, tirotoxicosis o insuficiencia cardíaca, uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, estenosis pilórica, íleo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave, miastenia gravis.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

Vía de Administración: Oral

Adultos y niños mayores de 12 años: 5 a 10mg (20 a 40 gotas), 3 a 5 veces al día.

Niños de 2 a 12 años: 0,5mg (2 gotas) por cada año, 3 a 5 veces al día.

Niños hasta 2 años: 0,5 a 1 mg (1 a 2 gotas) 3 a 4 veces al día.

SOBREDOSIFICACIÓN.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: retención urinaria, visión borrosa, taquicardia, dolores de cabeza, mareos, insomnio. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

ALMACENAMIENTO.

Mantenga en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN.

Envase con 15 mL de solución de Tricolon Simple gotas orales.