

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
ADOLEXMED-CELL
Comprimidos de disolución bucal

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición.

Cada comprimido de disolución bucal contiene:

Cetilpiridinio cloruro 2,5 mg

Alantoína 10,0 mg

Excipientes: Aspartamo, polividona, manitol, lactosa monohidrato, mentol, esencia de eucalipto, colorante FD y C azul N° 2 y estearato de magnesio.

Vía de administración.

Oral.

Clasificación.

Antiséptico y germicida bucofaringeo.

Indicaciones.

Está indicado como antiséptico y germicida bucofaringeo, coadyuvante en el tratamiento de procesos infecciosos de la boca, faringe y amígdalas.

Contraindicaciones.

No usar si Ud. ha experimentado alergias a desinfectantes cutáneos, enjuagatorios bucales u otros antisépticos bucofaringeos de otras marcas.

Reacciones adversas.

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un periodo de tiempo prolongado y/o en grandes dosis. Si aparece cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico: reacciones de tipo alérgicos como ardor y prurito (picazón).

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
N° REF.: 34982/05
02 ENE 2006
UNIDAD DE MODIFICACIONES

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

Precauciones y advertencias.

Las amigdalitis y otras infecciones pueden causar graves problemas a largo y mediano plazo si no son tratadas con los medicamentos adecuados y a través de un diagnóstico médico. Este medicamento puede aliviar el dolor de garganta y otros problemas asociados a este tipo de enfermedades, pero no cura ni previene sus complicaciones, por lo que es necesario un diagnóstico y tratamiento médico en tales casos. No se recomienda su uso en embarazo, lactancia y niños menores de 3 años.

Ancianos: Ud. debe informar a su médico o farmacéutico respecto a las enfermedades que tiene o los medicamentos que usa.

Otras: Acuda a su médico o farmacéutico ante cualquier duda respecto a la administración, efectos, riesgos o cualquier otro aspecto que Ud. considere importante aclarar o mencionar antes del uso del medicamento.

Este medicamento contiene aspartamo, precaución en pacientes fenilcetonúricos.

Forma de administración.

Deje disolver en la boca 1 comprimido cada 2 horas.

Condiciones de almacenamiento.

Mantenga fuera del alcance de los niños y en su envase original, protegido del calor (a no más de 25° C), luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicado en el envase.

Elaborado y envasado para MED-CELL S.A., Caupolicán 9261 A-B, Quilicura, Santiago - Chile, por Instituto Farmacéutico Labomed S.A., Av. Pdte. E. Frei M. (Panamericana Norte Km 21,5), Santiago. Distribuido por MED-CELL S.A.
Fono: 443.54.10

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**