

CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO

Comprimidos Recubiertos 10 mg

BIOEQUIVALENTE

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene:	
Ciclobenzaprina Clorhidrato	10 mg.
Excipientes: Los aprobados en registro	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Relajante muscular

Este medicamento es utilizado para el alivio de espasmos musculares asociado a condiciones agudas dolorosas músculo esquelético.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a la ciclobenzaprina y/o a sus excipientes. Glaucoma. Retención urinaria. Uso simultaneo con inhibidores de la MAO. Fase aguda post infarto de miocardio. Pacientes con arritmias cardíacas, bloqueo o Alteraciones de la conducción; insuficiencia cardíaca congestiva. Hipertiroidismo.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

Embarazo: este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia: se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna. Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

Lactantes y niños: no se recomienda el uso de ciclobenzaprina en menores de 15 años, a menos que su médico lo indique.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados).

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: retención de orina, confusión, dolor muscular, temblor, alucinaciones, depresión, dificultad para respirar, taquicardia, prurito, rash, urticaria, edema facial y lingual.

Otros efectos: pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento.

Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifican: somnolencia, sequedad de boca, mareos, debilidad, fatiga, hormigueos, mal sabor de boca. Visión, insomnio, dolor de cabeza, estreñimiento, sudoración, alteración de la frecuencia urinaria.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Antes de usar este medicamento deben evaluarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Principalmente debe considerar los siguientes aspectos: Debe usarse con precaución en pacientes con presión intraocular aumentada, epilepsia, insuficiencia hepática renal, hipertensión.

Mayores de 60 años: los ancianos deberán recibir una especial vigilancia durante el tratamiento con ciclobenzaprina ya que en ellos los efectos adversos se pueden ver acentuados.

Consumo de Alcohol: debe evitar el consumo de alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este acentúa los efectos adversos de la ciclobenzaprina.

Manejo de Vehículos: este medicamento puede causar en algunas personas mareos y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

Precauciones especiales: la suspensión del tratamiento debe realizarla poco a poco, según las indicaciones de su médico, ya que de lo contrario podría presentar malestar general, dolor de cabeza y náuseas.

Si ha estado o está en tratamiento con antidepresivos como tranilcipromina, moclobemida; deberá esperar al menos 14 días antes de iniciar el tratamiento con ciclobenzaprina. Este medicamento puede necesitar un ajuste de dosis en pacientes que tienen deterioro hepático severo, consulte con su médico si usted padece de algún tipo de daño al hígado.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

-Medicamentos: usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los

siguientes medicamentos: guanetidina, imipramina, nortriptilina, sertralina, fluoxetina, clorpromazina, tioridazina, clorfenamina, clemastina, fenobarbital, tranilcipromina, moclobemida.

-Enfermedades: usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de arritmias hipertiroidismo o ha sufrido un infarto al miocardio recientemente, glaucoma, problemas para orinar.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral

Lo puede tomar antes, durante o después de las comidas sin problemas; debe tomar el medicamento acompañado con un vaso de agua.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

-Adulto y niños mayores de 15 años 5 mg tres veces al día. Basado en la respuesta individual del paciente, la dosis puede ser aumentada a 10 mg tres veces al día. La dosis máxima diaria recomendada es de 60 mg al día.

No se recomienda el uso de Ciclobenzaprina clorhidrato por más de 2 a 3 semanas.

-En pacientes ancianos o con insuficiencia hepática se debe usar dosis reducida o disminuir la frecuencia de administración.

SOBREDOSIFICACIÓN.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: convulsiones, somnolencia severa, desmayos o latidos cardiacos rápidos o irregulares, respiración dificultosa, alucinaciones, aumento o disminución de la temperatura corporal, rigidez muscular inexplicable, nerviosismo, vómitos. En caso de intoxicación debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 25 ° C.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN.

Estuche de Ciclobenzaprina Clorhidrato 10 mg con 10 y 20 Comprimidos Recubiertos.