

# DERMICIN - B

## Crema Tópica

Eurofarma Chile S.A.

### **FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.**

Cada 100 g de crema contiene:	
Clotrimazol	1,0 g
Betametasona	0,064 g
Excipientes: Los aprobados en registro	

### **INDICACIONES TERAPÉUTICAS.**

#### **Antifúngico/Antiinflamatorio**

Esta asociación de medicamentos está indicada para el tratamiento de la micosis que se acompaña de prurito o inflamación.

### **CONTRAINDICACIONES.**

Si ha presentado síntomas de alergia a betametasona, clotrimazol u otro antifúngico azólico.  
Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

### **PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.**

- **Embarazo:** Este medicamento se absorbe por la piel y puede dañar al feto, por lo que debe hablar con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.
- **Lactancia:** Este medicamento es absorbido por la piel y puede pasar a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando. No debe aplicar este medicamento en el pecho antes de amamantar al niño.

### **EFECTOS ADVERSOS (no deseados)**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar, úlceras, quemazón, sequedad o descamación de la piel.

- **Otros efectos:** Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos

persiste o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, acné, crecimiento de vello (especialmente en la cara).

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.**

Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecido antes. Debe evitar el contacto de la crema con los ojos. Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe utilizar este medicamento para el tratamiento de acné, quemaduras, infecciones o desórdenes de pigmentación.

Evite usarlo en zonas cercanas a los ojos y en el rostro en general, sobre zona genital o rectal y en pliegues de la piel.

- **Mayores de 60 años:** Estos pacientes son más sensibles a los efectos adversos del medicamento, el médico debe ir evaluando cuidadosamente la cantidad a aplicar y la frecuencia.

- **Manejo de vehículos:** Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Lactantes y niños:** No se debe evitar aplicar en áreas extensas de la piel o por períodos prolongados de tiempo, el pediatra debe evaluar la necesidad de usar este medicamento en su niño.

- **Precauciones especiales:** Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecido acnés. Debe evitar el contacto de la crema con los ojos. Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. No debe utilizar este medicamento para el tratamiento de acné, quemaduras, infecciones o desórdenes de pigmentación. Evita usarlo en zonas cercanas a los ojos y en el rostro en general, sobre zona genital o rectal y en pliegues de la piel.

### **INTERACCIONES**

- **Medicamentos:** Ud., debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo. No debe aplicar, junto a este medicamento, preparaciones que contengan alcohol sobre la zona afectada.

- **Enfermedades:** Ud., debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de varicela, herpes simple, herpes zoster, tuberculosis.

## ***DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.***

**Vía de Administración:** Tópica

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso en particular, no obstante, se recomienda aplicar la crema dos veces al día en el área afectada. Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- **Consejo de cómo administrarlo:** Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos del último tratamiento. Debe lavar sus manos antes y después de cada aplicación. Se recomienda tomar bastante líquido.

- **Uso prolongado:** En general se utiliza solo en tratamientos cortos de 1 a 14 días. No debe usarlo por más o menos tiempo que el señalado por su médico. No lo use por períodos prolongados de tiempo y/o en áreas extensas de la piel.

## ***SOBREDOSIFICACIÓN***

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

## ***ALMACENAMIENTO***

Mantenga en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C. Mantenga fuera del alcance de los niños.

## ***PRESENTACIÓN***

Pomo con 15 g de Clotrimazol/Betametasona Crema.