

# DERMICIN

## Crema Tópica 1%

Eurofarma Chile S.A.

### ***FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.***

Cada 100 g de crema contiene:	
Clotrimazol	1,0 g
Excipientes: Los aprobados en registro	

### ***INDICACIONES TERAPÉUTICAS***

#### **Antifúngico.**

Este medicamento está indicado en el tratamiento tópico de la tinea pedis, tinea cruris y tinea corporis causada por Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Candidiasis causada por Malassezia Furfur complicadas con inflamación y prurito.

### ***CONTRAINDICACIONES***

Está contraindicado en pacientes hipersensibles al Clotrimazol y también a algunos excipientes de la crema.

### ***PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA***

- **Embarazo:** Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al feto.
- **Lactancia:** Este medicamento puede ser absorbido (aunque en pequeñas cantidades) por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

### ***EFECTOS ADVERSOS (no deseados)***

Reacciones de hipersensibilidad, tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

### ***ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES***

- **Mayores de 60 años:** No existen recomendaciones especiales para los ancianos.

**-Manejo de vehículos:** Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

**- Lactantes y niños:** El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta con su pediatra. No existen precauciones especiales en el caso del Clotrimazol tópico.

**-Precauciones especiales:** En caso de desarrollarse alguna reacción alérgica, como irritación y eritema de piel, el tratamiento deberá suspenderse.

Debe evitarse el contacto de la crema con los ojos.

## ***INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.***

No se han descrito.

## ***DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN.***

**Vía de Administración:** Tópica

**- Rango y frecuencia:** La dosis usual recomendada es: Aplicar Dermicin Crema al 1% dos veces al día (mañana y noche) en la zona afectada, durante 3 a 4 semanas.

La mejoría de los síntomas clínicos se observa dentro de la primera semana.

**- Consejo de cómo administrarlo:** Lavar la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos de último tratamiento. No se debe utilizar vendajes que no permitan transpirar a la zona de infección.

## ***SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO.***

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

## ***ALMACENAMIENTO.***

Mantenga en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C. Mantenga fuera del alcance de los niños.

## ***PRESENTACIÓN.***

Pomo 20 g de Dermicin con X pomos.