

FABUDOL

Cápsulas 20 mg

Eurofarma Chile S.A.

FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.

Cada cápsula contiene:	
Piroxicam	20 mg.
Excipientes: Los aprobados en registro.	

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Analgésico antiinflamatorio, antipirético.

Este medicamento está indicado en el tratamiento de estados inflamatorios y dolorosos agudos.

CONTRAINDICACIONES.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos: Si usted tiene úlcera gastroduodenal. Si ha presentado síntomas de alergia al Piroxicam o a medicamentos similares como el ácido acetilsalicílico (aspirina). Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación. No debe usar este medicamento en el periodo inmediato a un by pass coronario.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.

-Embarazo: Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

-Lactancia: Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados).

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las piernas, dolor en el pecho, úlcera péptica con vómitos con sangre, melena, disminución de la frecuencia para orinar o en la cantidad de orina.

-Otros efectos: Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, diarrea leve, constipación leve, dolor de cabeza leve, vértigo, somnolencia, úlceras o dolor en la boca, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies, visión azul rojiza; los cuales tienden a desaparecer con el tiempo, pero si continúan o empeoran, consulte con el médico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

- **Mayores de 60 años:** Los problemas estomacales pueden ser más severos en pacientes mayores de 60 años.

- **Consumo de alcohol:** Si usted toma alcohol junto al medicamento puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y hemorragias.
 - **Manejo de vehículos:** Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.
 - **Lactantes y niños:** Puede utilizarlo sólo si está indicado por su pediatra y bajo circunstancias específicas.
 - **Precauciones especiales:** Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía. Evite el consumo de otros antiinflamatorios mientras esté en tratamiento con Piroxicam. Informe a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes, medicamentos para la diabetes o diuréticos. Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardiaca). Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.
- Siga las instrucciones de su médico, respetando siempre los horarios, las dosis y duración del tratamiento.
 - No interrumpa el tratamiento sin consentimiento del médico.
 - No use el medicamento con el plazo de validez vencido,
 - Converse con su médico y siga todas sus recomendaciones en relación a las dosis prescritas.
 - Antes de usar observe el aspecto del medicamento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Medicamentos: Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: medicamentos para la presión, prednisona, warfarina, antibióticos, Itraconazol o Ketoconazol, Penicilamina, Acido Valproico, Fenitoína, Ciclosporina, Digoxina o Digitoxina, Litio, Metotrexato, Probenecid, Triamtereno o Zidovudina (AZT). No se debe tomar en forma conjunta con otros medicamentos como ácido acetilsalicílico (aspirina) (o similares) a menos que su médico así lo determine.

Enfermedades: Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de hemorragias, inflamación o úlceras en el estómago e intestinos, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, anemia, asma, epilepsia, enfermedad de Parkinson, cálculos renales, o historia de enfermedades al corazón o consumo crónico de alcohol, enfermedades renales o al hígado.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.

Vía de Administración: Oral

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Rango y frecuencia:** 10 a 40 mg al día según la indicación de su médico.
- **Consejo de cómo administrarlo:** Debe tomarlo en conjunto con alimentos o antiácidos, para evitar irritación estomacal.
- **Uso prolongado:** Le puede causar problemas estomacales (úlceras), inflamación del hígado, problemas a los riñones y hemorragias. Por lo que debe realizar visitas periódicas a su médico.

SOBREDOSIFICACIÓN.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y malestar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

ALMACENAMIENTO.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.

PRESENTACIÓN.

Envase conteniendo 10 cápsulas de Fabudol 20 mg.