

# TRICOLON COMPUESTO

## Solución para Gotas Orales

Eurofarma Chile S.A.

### **FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.**

Cada 1,0 mL de solución para gotas orales contiene:	
Pargeverina Clorhidrato	6,0 mg
Metamizol Magnésico	300,0 mg
Excipientes: Los aprobados en registro.	

### **INDICACIONES TERAPÉUTICAS**

#### **Asociación de analgésico y antiespasmódico.**

Está indicado en la terapia de los síndromes espasmódicos y/o dolorosos de origen gastrointestinal, hepatobiliar, de las vías urinarias y aparato genital femenino.

### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad conocida a Pargeverina, a Metamizol o a cualquier otro componente de la formulación. Debe evitarse el empleo del medicamento, en pacientes que padezcan de úlcera gástrica en actividad o presenten hemorragia alta de origen gástrico. Uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, acalasia, estenosis pilórica, ileo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave o miastenia gravis, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, falla renal o hepática.

### **PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.**

**Embarazo:** Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

**Lactancia:** Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

### **EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: retención urinaria, visión borrosa, taquicardia, dolores de cabeza, mareos, insomnio, reacciones alérgicas. Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste se intensifican: sequedad bucal, estreñimiento, dilatación de la pupila con pérdida de la acomodación y fotofobia leve.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.**

**Mayores de 60 años:** Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con Metamizol – Pargeverina.

**Consumo de alcohol:** Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que se pueden ver intensificados los efectos adversos del medicamento.

**Lactantes y niños:** Se debe utilizar con precaución en niños; bajo la indicación y control de su pediatra.

### **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.**

**Medicamentos:** Se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: clorfenamina, hidroxicina, loratadina, amitriptilina, clorpromazina, ciclosporina, fenilbutazona, warfarina, quinidina, alcohol.

**Enfermedades:** Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de glaucoma de ángulo abierto, tirotoxicosis o insuficiencia cardíaca, uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, estenosis pilórica, íleo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave, miastenia gravis, asma, taquiarritmias, glaucoma, hipertrofia prostática, megacolon, agranulocitosis.

**Exámenes de Laboratorio:** Metamizol magnésico puede alterar los resultados de exámenes de glucosa en orina, por lo que debe avisar que se encuentra tomando este medicamento antes de practicarse el examen.

### **DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.**

#### **Vía de Administración: Oral**

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

**Adultos y niños mayores de 12 años:** 20 - 40 gotas, 3 a 5 veces al día.

**Niños de 2 a 12 años:** 2 gotas por año, 3 a 5 veces al día.

**Niños hasta 2 años:** 2 - 4 gotas, 3 a 5 veces al día.

### **SOBREDOSIFICACIÓN**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: retención urinaria, visión borrosa, taquicardia, dolores de cabeza, mareos, insomnio, escalofríos, vértigo, náuseas, disminución en la frecuencia para orinar.

### **ALMACENAMIENTO.**

Mantenga en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

### **PRESENTACIÓN.**

Envase con 15 mL de solución para gotas orales de Tricolon Compuesto.